

ເຫດໄຟໄລ໌ 3 ກາຣມປຣຖປອາທາດ



664.8/9

ສຄບ

ລ.3 ລ.2



ສາທາລະນະລົຊັບວິທະຍາຄາສດຮັບແລະເຫດໃນໄລຍືແໜ່ງປະເທດໄທຢາ [ວວ.]

ສາທາລະນະລັດ
ລາວ
ສັນຕິພາບ
ແຫ່ງຊາດ

ວວ.

016507

ສາບັນລາກຜູ້ວ່າກາຮ



ສາບັນວິຊີວິທະຍາສາສຕຣີແລະເທຄໂນ ໂລຍໍແໜ່ງປະເທດໄທຢ (ວວ.) ດຳນິນຈານ
ວິຊີພັດນາຄ່າຍທອດເທກໂນ ໂລຍໍ ແລະ ໄຫບວິກາທາງວິທະຍາສາສຕຣີແລະເທຄໂນ ໂລຍໍ
ທັງການຮູ້ແລະເອກະນາມອ່າງຍາວນານດຶງ 43 ປີ ຈຶ່ງມີສັກຍາພສູງໃນດ້ານ
ພລິຕົກລົມທີ່ອາຫາດແປປຽບປາຈພລິຕົກເກຍທຽບຂອງປະເທດໄທໃໝ່ມູນຄ່າເພີ່ມແລະຄອງໄວ້
ໜີ້ຄຸນຄ່າທາງໂກໝານາກ

ໜັງສື່ອ “ເທຄໂນ ໂລຍໍການແປປຽບປາຫາຍ 3” ເລີ່ມນີ້ ເປັນການເຮັບເຮັງຈາກ
ປະສົບການລົມແລະຈາກພລງານວິຊີແລະພັດນາຂອງນັກວິຊີໃນຝ່າຍເທຄໂນ ໂລຍໍອາຫາຍ ວວ.
ທີ່ໄດ້ເລີ່ມເຫັນດີ້ຄຸນຄ່າຂ່າຍອົງນໍາສົ່ມສາຍຫຼຸ້ມນັກ ຜົ່ງນອກຈາກຈະໃໝ່ບວິໂປົກເປັນອາຫາດແລ້ວ
ຢັ້ງສາມາດນຳໄປໄຫ້ປະໂຍ້ນໄດ້ອັກຫລາກຫລາຍ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດທໍາໜັງສື່ອດັກລ່າວ່ົນ ເພື່ອ



ສາບັນວິຊີວິທະຍາສາສຕຣີແລະເທຄໂນ ໂລຍໍແໜ່ງປະເທດໄທຢ (ວວ.)

เผยแพร่่องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้เพื่อเป็นวิชาชีพ หรือการผลิตเพื่อบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย

วว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้คงมีสาระประโภชน์สำหรับท่านผู้อ่าน ไม่นำก็น้อย

ด้วยความปรารถนาดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(นางนงลักษณ์ ปานเกิดดี)

ผู้ว่าการ

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

กิจกรรมประจำเดือน

หนังสือเล่มนี้สำเร็จได้เนื่องจากการรวบรวมผลงานวิจัยเรื่องน้ำส้มสายชูหมักจากตลาดโคนดที่ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดำเนินงานระหว่างปี 2542 – 2544 ร่วมกับเกษตรกรในตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และผลการศึกษาของกีรติ์ เทราบุลย์ หลวงสมานวนกิจ, อาจารย์ปฏิรูป บุนนาค, รศ. ดร. สมยศ ทุ่งหว้า ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลมากพอที่จะนำมาประกอบในเนื้อหา นอกเหนือไปนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ได้อนุมัติให้นำข้อปฏิบัติทั่วไปที่จำเป็นในการผลิตและการสุขาภิบาลของผู้ปฏิบัติงาน ลงเผยแพร่ ขอขอบพระคุณ นายревต์ วิบูลย์ศิริชัย งานเผยแพร่ข่าวสาร กองประชาสัมพันธ์ วว. ผู้ที่เขียนการศึกษาเรื่องการผลิตน้ำส้มสายชูหมักที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้

สุดท้าย ขอขอบคุณ กองผลิตและเผยแพร่สารนิเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่ช่วยดำเนินการตรวจแก้ไขหนังสือเล่มนี้



ເຫດໃນໄຄຍົກາຮແປຣງູປວາຫາຮ 3

ISBN : 974-953-424-7

ສຈວນລືບສິທີ

ພິມພັກສັ່ງທີ 1	ພຸດສະພາດ 2549 ຈຳນວນ 5,000 ເລີນ
ຈັດພິມພົດໄຍ	ສຕາບັນວິຊຍົກາສົດຮັບແລະເຖກໂນ ໂລຍືແຫ່ງປະເທດໄທຢ (ວວ.) 35 ນູ້ 3 ເທດໂນຈານີ ຕ.ຄລອງທ້າ ອ.ຄລອງທລວງ ຈ.ປັກທຸນານີ 12120 ໄທຮັສພົດ 0 2577 9000 ໄທຮສາຣ 0 2577 9009 CallCenter. 0 2579 3000 www.tistr.or.th
ຈັດຈຳໜາໄໝໄດຍ	ບຣິນັກ ຜົ່ອເອົ້ດຍເຂັ້ນ ຈຳກັດ (ມາຫານ) SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED ອາຄາຣເນັ້ນທາວເວອຣ ຂັ້ນທີ 19 ເລຂທີ 46/87-90 ດນນບາງນາ-ຕລາດ ແບວງບາງນາ ເບຕບາງນາ ກຽມທະພາ 10260 ໄທຮັສພົດ 0 2739-8222, 0 2739-8000 ໄທຮສາຣ 0 2739-8356-9 http:// www.se-ed.com
ພິມພົດ	ໂຮງພິມພົດ ສຕາບັນວິຊຍົກາສົດຮັບແລະເຖກໂນ ໂລຍື ແຫ່ງປະເທດໄທຢ (ວວ.) ໄທຮ. 0 2579 1121-30, 0 2579 5515
ຮາຄາ	80 ບາທ

ດោនា

ตามบันทึกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ได้ทำการวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากตานาโคนคุณภาพสูงในนามัยในปี 2542-2544 ตามความต้องการของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีนโยบายอนุรักษ์ต้นตานาโคนพร้อมทั้งเพิ่มนวลด้านผลิตภัณฑ์จากต้นตานาโคน การสำรวจการปรับรูปผลิตภัณฑ์จากตานาโคนเป็นอาหารพบว่า การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากตานาโคนแบบที่ชาวบ้านผลิต มีโอกาสพัฒนาให้เป็นน้ำส้มสายชูหมักที่มีคุณภาพ มีความเปรี้ยวหวานมาก เก็บรักษาได้นานโดยไม่เกิดหอน้ำส้ม สามารถส่งขายในกรุงเทพมหานคร ได้ในราคากลางๆ ที่ขายในท้องถิ่น หรือขายได้ราคาใกล้เคียงกับน้ำส้มสายชูหมักที่ผลิตในต่างประเทศ เช่น น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิล

หนังสือเล่นนี้หมายความว่ารับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นผลิตนำสัมภาษณ์มักจากตลาดโตนด เพราะเนื้อหากล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำนำสัมภาษณ์มักจากตลาดโตนด การผลิตนำสัมภาษณ์มักจากตลาดโตนดที่ถูกสุขอนามัยโดยนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูน เพื่อจ่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยมีการผลิต 2 แบบ คือ แบบใช้น้ำตาลสดครึ่งละ $\frac{1}{2}$ - 5 ปีบ และแบบใช้น้ำตาลสดครึ่งละ $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ปีบ อนึ่งวิธีการผลิตนำสัมภาษณ์มักจากตลาดโตนดนี้ได้จากการวิจัยและพัฒนาพร้อมปรับปรุงวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับการทำงานกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้กับน้ำตาลสดจากมะพร้าว นำสัมภาษณ์มักที่ผลิตได้มีความเปรี้ยวคงที่สม่ำเสมอ ลักษณะใส ไม่ตกร่อง กึ่งไดานาน ไม่มีหมอนนำสัม มีกลิ่นรสเหมาะสมสำหรับทำอาหารของชาวใต้ ฯ. ได้พัฒนาสูตรอาหาร โดยใช้น้ำสัมภาษณ์มักจากตลาดโตนดที่ผลิตได้คือ ต้มสัม แกงสัม แกงเหลือง น้ำจิมไก่ น้ำสัดด้ เป็นต้น รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น คราบตู้เย็น ฝาผนัง สายนาฬิกา คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ กระดานเขียนไวท์บอร์ด (whiteboard) มีคสเดนเลส ที่ทำความสะอาดแล้วยังมีกรอบติดอยู่ สติกเกอร์ที่ลอกไม่หมด บรรยายปากกาลูกลื่นที่ติดเสื้อผ้า กระไก และโทรศัพท์ เป็นต้น






สารบัญ

สาร์จากผู้ว่าการ กิตติกรรมประกาศ	1
คำนำ	3
ลักษณะทางสิริร่วมและนิเวศวิทยาของตาลโตนด	5
การใช้ประโยชน์จากตาลโตนด	9
การผลิตนำ้ส้มสายชูหมักจากตาลโตนดที่ถูกสุขอนามัย	12
สูตรอาหารที่ใช้น้ำส้มสายชูหมักจากน้ำหวานตาลโตนด	13
การใช้ประโยชน์จากนำ้ส้มสายชูหมักจากตาลโตนด	56
เอกสารอ้างอิง	67
ภาคผนวกที่ 1	69
- คณะผู้ดำเนินการวิจัยนำ้ส้มสายชูหมักจากตาลโตนด	70
ภาคผนวกที่ 2	
- ข้อปฏิบัติที่นำไปที่จำเป็นในการผลิตและการสุขาภิบาลของผู้ปฏิบัติงาน	72
ภาคผนวกที่ 3	
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 204 (พ.ศ. 2543) เรื่องนำ้ส้มสายชู	74







ตาลโตนด (Palmyra Palm)

ตาลโตนด เป็นพืชตระกูลปาล์มใบพัดชนิดหนึ่ง มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นอันดับสองรองมาจากมะพร้าว ถิ่นกำเนิดไม่ทราบแน่ชัด แต่นักชีววิทยาลงความเห็นว่าอยู่ทางตอนใต้ของเอเชีย โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของอินเดียแล้วขยายไปสู่ศรีลังกา พม่า ไทย อินโดนีเซีย กัมพูชา มีชื่อทางพุทธศาสนาว่า *Borassus flabellifer* L. มีชื่อสามัญเป็นภาษาอังกฤษว่า Palmyra Palm หรือ lontar, talfanpalm ในประเทศไทยมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ต้นตาล (ภาคกลาง) ตาลโตนด, ต้นโหนด (ภาคใต้) ปอเกี๊ยะตา (จังหวัดยะลา, ปัตตานี)

ตาลโตนดเป็นพืชเมืองร้อนที่เจริญได้ดีในสภาพค่อนข้างแห้งแล้ง เช่น ดินรายดินปนทรายและดินเหนียว ไม่ชอบดินกรดแต่ก็เจริญในที่ชุ่มน้ำได้ แม้แต่ในดินที่เปียก จะ และไม่มีพันธุ์ไม่ปักคลุม ซึ่งพบตามนาข้าว ใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำตาล น้ำส้มสายชู สุรา ผลอ่อนใช้เป็นอาหาร ได้หลายชนิด เป็นทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์ ผลสุกน้ำมันเพาะเป็น嫁ตาล นอกจากนี้อาจใช้ประโยชน์จากส่วนอื่นๆ เช่น จากใบผลที่มีลักษณะเป็นเส้น ใบ และส่วนของลำต้น ใช้ในการทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

ปัจจุบันในประเทศไทยมีมากແฉบภาคกลางบริเวณจังหวัดเพชรบุรี นครปฐม และภาคใต้บริเวณจังหวัดสงขลา อำเภอสทิงพระ และอำเภอระโนด

ลักษณะทางสรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของตาลโตนด

ลำต้นตาลโตนด เป็นลำต้นเดี่ยว (single stem) เป็นลำต้นที่ขึ้นจากพื้นดิน เพียงต้นเดียว ไม่มีหน่อ ลำต้นมีขนาดใหญ่ เปลือกลำต้นธูรูบะ และมีสีเขียวเข้ม เป็นวงช้อนๆ กัน หรือคำกรียมเป็นเสี้ยนแข็ง เหนียว ไม่หักง่าย เนื้อแข็งจะอยู่ภายนอก และค่อยๆ อ่อนเข้าไปสู่ภายในลำต้น มีความสูงโดยปกติ 18-25 เมตร (บางต้นอาจสูงถึง 30 เมตร) ลำต้นตรงหรือโค้งเล็กน้อย โคนต้นอ่อนไหว วัดโดยรอบได้ประมาณ 1 เมตร

เมื่อความสูงประมาณ 4 เมตร ลำต้นจะเริ่มเรียวลง วัดโดยรอบได้ประมาณ 40 เซนติเมตร ระยะ 10 เมตร นับจากพื้นดินลำต้นจะเริ่มขยายออกใหม่จนวัดโดยรอบได้ประมาณ 50 เซนติเมตร และคงขนาดนี้ไปจนถึงยอด

ใบมีลักษณะขาไหง่าย เป็นรูปพัด (Flobellate หรือ Fan leak หรือ Palmate) ในจะมีใบย่อยเรียกว่า Segment ซึ่งจะแตกออกจากจุดเดียวกับที่ปลายก้านใบและตามขอบทางจะมีหนามทุกสีดำติดอยู่

ยอดatalประกอบด้วยใบatalประมาณ 25-40 ใบ (แล้วแต่อายุatal) ใบมีสีเขียวเข้มเป็นรูปวงรัศมีประมาณ 4 เมตร ถ้าatalต้นได้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใบแก่สิน้ำatalอ่อนจะห้อยแบบลำต้นเป็นรัศมีวงกลมความกว้างของใบวัดได้ 50-70 เซนติเมตร ใบแต่ละใบอายุไม่เกิน 3 ปี atal โคนดต้นหนึ่ง สามารถให้ใบatalได้ 12-15 ใบต่อปี ส่วนที่เป็นทางatalอาจยาวถึง 2 เมตร ทางatalนี้จะหนาโก้งตามความยาว รอบทั้งสองข้างมีหนามแหลมขนาดไม่สม่ำเสมอ กัน

รากatalเป็นเส้นกลมยาว เป็นกระฉูกคล้ายมะพร้าวแต่หยังลึกลงไปในดินไม่แพร่ไปตามผิวดินเหมือนรากมะพร้าว บนนั้นจึงไม่รับกวนดันข้ามเมื่อปลูกลงบนคันนา จึงใช้ปลูกเพื่อเป็นหลักในการแบ่งเขตของคันนาหรือเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับคันในบริเวณที่ทำการทดน้ำเข้านา

atal โคนดเป็นไม้ที่มีต้นเพชรผู้และต้นเพชรเมียแยกกัน ชื่อดอกของต้นเพชรผู้แตกแขนงออกเป็น 2-4 วงศ์ต่อข้อ ยาววงละประมาณ 30-40 เซนติเมตรในแต่ละวงศ์มีดอกเล็กๆ ต้นหนึ่งจะมีช่อดอก 3-9 ช่อ ต้นเพชรเมียจะออกช่อหดต้นเพชรผู้เล็กน้อย มีประมาณ 10 กว่าช่อ ขนาดใหญ่และชุมน้ำหวานมากกว่า ในแต่ละช่อจะมีดอกน้อยกว่าดอกเพชรผู้ (ประมาณ 10 ดอก ในช่อกลุ่มที่มีวง 3 วงศ์) ทึ้งต้นเพชรผู้และต้นเพชรเมียจะทยอยออกช่อเรื่อยๆ แม้จะมีจำนวนน้อย แต่สามารถเก็บรองน้ำatalได้ตลอดปี

atal โคนดจะให้ดอกให้ผลหลายครั้งจนกว่าจะแก่ตายไป ผลอ่อนมีสีเขียวติดอยู่บนทะลายคล้ายมะพร้าวผลแก่แล้วมีสิน้ำatalเข้มหรือสีดำเป็นมัน ผลโตขนาดเท่าผลส้มโอ ภายในเป็นสันและอี่ดเมื่อสุกจะมีสีเหลืองแก่ เนื้อประกอบด้วยเปลแปลน้ำatalทะลายหนึ่งมีประมาณ 10-15 ผล ผลหนึ่งโดยทั่วไปจะมี 3 เมล็ด อยู่ภายใน มีลักษณะแบบๆ หนาครึ่งนิ้ว ยาวประมาณ 3 นิ้ว

การปูกลุกตาลโตนด

นำเมล็ดพันธุ์ตาลโตนดสูกที่ร่วงจากต้นนำมาแห่น้ำ (หมักประมาณ 1 เดือน) นำขี้น้ำจากน้ำ นำมาของบนพื้นใช้ฟางข้าวคลุมให้มิด จากนั้นให้น้ำประมาณ 3 วัน/ครั้ง หลังจากบ่มประมาณ 15 วัน เมล็ดจะเริ่งออกสามารถนำไปปูกลุกได้ แต่ต้องระวังอย่าให้หน่อหักหรือกระแทกระเทื่อง

- ระยะปูกลุก 6 x 6 เมตร

- ชุดคลุมขนาด 20 x 20 x 20 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกกับดินปูกลุก กลบดินจนเต็มหลุม แล้วฝังเมล็ดให้ลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร

ตาลโตนดเป็นพืชที่ทนต่อสภาพแวดล้อม แต่ควรปูกลุกในช่วงต้นฤดูฝนและควรป้องกันสัตว์เลี้ยงเหยียบย้ำช่วงปูกลุกใหม่ เมื่ออายุ 3-5 ปี ต้นตาลจะเริ่มตั้งสะโพก ควรตัดแต่งทางตาลให้มีใบประมาณ 15-20 ใบ จะช่วยให้ต้นตาลเจริญเติบโตได้เร็ว

ต้นตาลจะเริ่มเก็บเกี่ยวผล ได้เมื่ออายุประมาณ 15 ปีขึ้นไป หลังจากออกดอกจัน แล้ว 2 ½ - 3 เดือน สามารถเก็บผลขายตอนตลาดได้ โดยการเฉพาะลดลงขายราคาประมาณ 8-15 บาท/กิโลกรัม

การทำน้ำตาลโตนด

น้ำตาลโตนดได้จากช่องคอส่วนที่เรียกว่า “วงตาล” และ “ปลีตาล” ซึ่งสามารถทำน้ำตาลได้ทั้งต้นตัวผู้และต้นตัวเมีย วิธีการซึ่งมีวิธีการที่คล้ายๆ กัน จะแตกต่างกันเฉพาะไม่นานด้วยน้ำจันซึ่งไม่นานด้วยน้ำจันของต้นตัวผู้จะใช้ไม่นานด้วยน้ำจันที่แบบและสันกวา ส่วนของต้นตัวเมียจะใช้ไม่กalemและยาวเรียกว่า “ไม้คานตาล” การทำน้ำตาลของเกษตรกร จังหวัดสangkhla จะทำน้ำตาลมา告知ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม



การใช้ประโยชน์จากตาลโตนด

ตาลโตนดมีส่วนต่างๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้



- | | |
|---------------|---|
| ลำต้น | - เครื่องเรือน
- ก่อสร้าง
- เชื้อเพลิง
- รั่ว
- เชื้อเพลิง |
| ทางตาล | - เส้นใยนุ่ม ใช้ทำเครื่องจักสาน และเบนนิด
- เส้นใยทำเนื้อนิด |
| ใบตาล | - มุงหลังคา
- เชื้อเพลิง
- ลินปลุย |
| ผลตาล | - บริโภคสด (ผลอ่อน)
- คันน้ำผลแก่ใช้ปูรูดแต่งกลิ่นรสนมตาล
- ผลแก่ใช้เป็นอาหารของวัวและหมู
- เปลือกหุ่มเมล็ดตาลแห้ง ใช้เป็นเชื้อเพลิง |
| เมล็ด | - ขาวตาลใช้บริโภค
- เมล็ดแก่ใช้ทำถ่าน |
| น้ำตาลโตนด | - น้ำตาลสดบริโภค
- เคี่ยวเป็นน้ำผึ้ง ทำน้ำตาลปีกน้ำตาลแวน |
| ราก | - หวาน เครื่องดื่มเยลโก้ออสต์ |
| ช่องดอกตัวผู้ | - น้ำส้มสายชูจากน้ำตาลโตนด
- ใช้ทำยาธาร์กยาโรค
- ตาลแห้งใช้เป็นส่วนผสมยาบำรุงกำลัง |

การผลิตน้ำส้มสายชูหมัก จากน้ำตาลโตนดที่ถูกสุขอนามัย

คุณจะผู้จัดทำข้อมูลเช่นการ์ตูนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำตาลโตนดที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ดังนี้

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์เริ่มตั้งแต่ หน้า 14-15
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำหวานตาลโตนด ในหน้า 16
- วิธีการทำความสะอาดภาชนะหมักน้ำส้มสายชู ในหน้า 17
- วิธีการเตรียมน้ำตาลโตนด เพื่อทำน้ำส้มสายชูหมัก ในหน้า 18
- วิธีทำน้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนดในกรณีที่มีน้ำตาลสลดมากประมาณวันละ $1\frac{1}{2}$ - 5 ปีบ ในหน้า 19-33
- วิธีทำน้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนดในกรณีที่มีน้ำตาลสลดประมาณวันละ $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ปีบ ในหน้า 34-49
- ข้อควรระวังในการทำน้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนด ในหน้า 50
- การควบคุมความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนด ในหน้า 51
- การหยุดการทำงานของเชื้อหมักน้ำส้มสายชูหมัก และการทำให้น้ำส้มสายชูหมักใส ในหน้า 52
- การบรรจุน้ำส้มสายชูหมัก ในหน้า 53
- การล้างไส้กรอง ในหน้า 53



ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชุดน้ำทราย

ชุดน้ำทราย คือ สิ่งมีชีวิตเล็ก ที่มีคงไม่เห็นด้วยตาเปล่า มีอยู่ทั่วไป ชุดน้ำทราย ที่รู้จักกันในการทำอาหารมี 3 ชนิด คือ แบบต์เรีย ยีสต์ และรา ชุดน้ำทราย ทั้ง 3 ชนิด ต้องการอาหาร สารอาหารแวดล้อม ทั้งอุณหภูมิ อากาศ ความชื้น ภาวะความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมในระหว่างการเจริญเติบโต ชุดน้ำทรายแต่ละชนิดจะสร้างสารต่างๆ ของมาและสารต่างๆ



เหล่านี้จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมต่างกัน

การหมัก เกิดขึ้นโดยชุดน้ำทรายสร้างสารที่เรียกว่า
เอนไซม์ ซึ่งมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารอินทรีย์
หรือ อาหารชุดน้ำทรายนั้นเจริญเติบโตอยู่





มีสต์



ก



glucosid woodt. after Klein, 1906

๑. *E. fiediana*



๒. *E. scabrum*



๓. *E. alactolyticum*



๔. *E. budayi*

แบคทีเรีย



ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำน้ำสัมสายชูหมาก จากน้ำหวานจากตาลโตนด

น้ำหวานจากตาลโตนด → เท้า (/molal solution)

อุกเป็นเท้า
(ซีดต์)

- ✓ น้ำหวานจากตาลโตนดที่ได้มาต้องนำมารอง เจาแมลงแล้วสีงอกปรงอุด แล้วต้มให้เดือดนาน 30 นาที เพื่อท่านลายชูลินทร์ท่างๆ ให้หมดไปแล้ว ใส่ยังสต์ หรืออุกเป็นเท้า ซึ่งเป็นชุดน้ำร้อนไห้เปลี่ยนน้ำตาลในน้ำหวานจากตาลโตนด ให้เป็นผลกอหลั่นที่เรียกเท้า
- ✓ ยังสต์นี้เจริญเติบโตได้ดีโดยไม่ต้องใช้อากาศ และสามารถแวดล้อมต่อหน้าไฟบางเป็นการดี
- ✓ ยังสต์นี้เจริญเติบโต จะผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้เกิดฟองเหมือนกับ การเดือด และผลิตเอนไซม์ที่เปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นผลกอหลั่นที่เรียกเท้า
- ✓ ยังสต์นี้จะตายที่อุณหภูมิสูง ดันน้ำการใส่ยูนิคเป็นเท้าก็เรียกว่ายังสต์นี้ต้องใส่เมื่อ น้ำหวานจากตาลโตนดมีอุณหภูมิอุ่นดี 35-40°ช. หรือให้ถอยดหั้งฝ่ามือร้อนไว้ร้อนพอจนได้ แบบเดียวกับที่กดสอนยกที่ซุกเพื่อให้อุ่นอีก

เท้า (/molal solution) → น้ำสัมสายชู (กรดน้ำสัม)

อุกเป็นน้ำสัม
(แบตที่เรีย)

- ✓ แบตที่เรีย น้ำจะเปลี่ยนผลกอหลั่นให้เป็นกรดน้ำสัม หรือกรด แบตซิติก ซึ่งทำให้เกิดสารบูร์ยา
- ✓ แบตที่เรียนี้เจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่มีอากาศ ซึ่งต้องมีการควบคุม ให้มีอุณหภูมิ



วิธีการทำความสะอาดภาชนะหมักน้ำส้มสายชู

1



2



ล้างโป้งด้วยน้ำเกลือ 80% (เกลือ 80 ส่วน
น้ำ 20 ส่วน) เตรียมครั้งละ 1 กก./กรัม
ใช้เกลือเม็ด 8 ช้อน น้ำ 2 ช้อน ใช้มีดที่ใส่ถุงมืออย่าง
ดูบเนื้อเกลือให้ทั่วภายในโป้งและปาโป้ง^{ให้}
นาน 5 นาที เทน้ำเกลือออก และล้างน้ำสะอาด
(น้ำต้มเดือด, ทิ้งให้เย็น)



3

หมายไว้ในแต่เดียวๆ ให้โป้งแห้งสนิท



4

ควรปิดบานภาชนะที่สะอาด ตามัด
โองร้อนจัดทิ้งให้เย็นก่อนนำมาใช้



วิธีการเตรียมน้ำตาลไชแนด เพื่อทำน้ำส้มสายชูหมักมี 2 วิธีดังนี้

1. การต้ม โดยนำน้ำตาลโคนคماกรองผ่านผ้าขาวบาง และต้มให้เดือด ลดไฟจนอุณหภูมิเหลือประมาณ 90 องศาเซลเซียส ต้มนาน 15 นาที และตักน้ำตาลใส่ปืน 20 ลิตร ปิดปากปืนด้วยผ้าขาวบาง ตั้งทิ้งไว้ให้อุณหภูมิเหลือประมาณ 70 องศาเซลเซียส และบรรจุน้ำตาลโคนคตามปริมาตรที่กำหนดใส่ถังพลาสติกปิดสนิท ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนำไปใช้ทำน้ำส้มสายชูหมัก น้ำส้มสายชูหมักที่ได้จะมีสีน้ำตาลเข้ม

2. การใช้สารเคมี โดยนำน้ำตาลโคนคماกรองผ่านผ้าขาวบาง ใส่ถังพลาสติกปิดสนิทตามปริมาตรที่กำหนด และใส่โพแทสเซียมเมทาไบแซลไฟต์ (KMS) 160 ppm ปิดฝาถังให้สนิท เขย่าให้ KMS ละลายให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนนำไปใช้ทำน้ำส้มสายชูหมัก น้ำส้มสายชูหมักที่ได้จะมีสีเหมือนน้ำตาลสด



ສຽງປະຕາງວລາກາរຜລິດນໍາສັນສາຍຫຼຸມນັກຈາກນ້ຳຕາລໂຕນັດທີ່ອຸກສູນອນນັ້ນຍ້າ ດານກາພຕ່າງ ຖ.

ວັນທີ ^{1/}	ໂອ່ງ ກ.	ໂອ່ງ ບ.	ໂອ່ງ ຄ.	ໂອ່ງ 1	ໂອ່ງ 2	ໂອ່ງ 3	ໂອ່ງ ລູ.	ໂອ່ງ ລູ.	ໂອ່ງ ລູ.	ໂອ່ງ ລູ.	ປີບ ^{2/}	
1	ກາພທີ 1											½
4	ກາພທີ 2			ກາພທີ 2	ກາພທີ 2	ກາພທີ 2						1 ½
8	ກາພທີ 3						1 ½					
12	ກາພທີ 4-1						1 ½					
15				ກາພທີ 5-1	ກາພທີ 5-1	ກາພທີ 5-1	ກາພ 5-1 (5 ປຶ້ນ)					5
19	ກາພທີ 6-1	ກາພ 6-1 (8 ປຶ້ນ)					1 ½					
22	ກາພທີ 4-2						1 ½					
25				ກາພທີ 5-2	ກາພທີ 5-2	ກາພທີ 5-2	ກາພ 5-2 (5 ປຶ້ນ)					5
29	ກາພທີ 6-2	ກາພ 6-2 (8 ປຶ້ນ)					1 ½					
32	ກາພທີ 4-3						1 ½					
35				ກາພທີ 5-3	ກາພທີ 5-3	ກາພທີ 5-3			ກາພ 5-3 (5 ປຶ້ນ)			5
39	ກາພທີ 6-3			ກາພ 6-3 (8 ປຶ້ນ)			1 ½					
42	ກາພທີ 4-4						1 ½					
45				ກາພທີ 7	ກາພທີ 7	ກາພທີ 7					ກາພ 7 (5 ປຶ້ນ)	3 ½
49	ກາພທີ 8	ກາພທີ 8	ກາພທີ 8								ກາພ 8 (8 ປຶ້ນ)	-


^{1/} ທຳກາຣກດອງ

^{2/} ປົມມາລັນ້ຳຕາລສັດທິໃໝ່

วันที่ 4 ของการทดลอง


ภาพที่ 2 วิธีขยายหัวเชื้อเหล้าจากโอง ก. ลงในโอง 1,2,3+วิธี
วิธีใช้ถุงแพ้งน้ำส้มสายชู

แบ่งเหล้าจากโอง ก. ใส่ในโอง 1,2
และ 3 จำนวน 2 กระบอก หรือ 0.2 ลิตร




วันที่ 8 ของการทดลอง

ภาพที่ 3 วิธีขยายหัวเชื้อน้ำส้มสายชู โดยเพิ่มโอง ข และ ด




วันที่ 12 ของการทดลอง

ภาพที่ 4-1 วิธีขยายหัวเชื้อน้ำส้มสายชูในโอ่อง ก,ข และ ด และ ขยายหัวเชื้อเหล้าในโอ่อง 1,2 และ 3




วันที่ 15 ของการทดลอง
ภาพที่ 5-1 วิธีขยายหัวเชือเหล็กในโอ่องใหญ่ 1



วันที่ 19 ของการทดลอง


ภาพที่ 6-1 หมักน้ำส้มสายชูในโถ่ใหญ่ 1

ถ่ายหัวเชือกน้ำส้มจากโถ 3, 6 และ ค
ลงในโถ่ใหญ่ 1 เหลือหัวเชือกเหล่าน้ำส้มสายชู
โถ่ละ 2 กระบอก




วันที่ 22 ของการทดลอง

ภาพที่ 4-2 วิธีขยายหัวเชื้อน้ำส้มสายชูในโอง ก, ข และ ค และขยายหัวเชื้อเหล้าในโอง 1, 2 และ 3



วันที่ 25 ของการทดลอง


ภาพที่ 5-2 วิธีขยายหัวเชือกเหล้า ใบโองใหญ่ 2



วันที่ 29 ของการทดลอง


ภาพที่ 6-2 หมักน้ำส้มสายชูในอ่องใหญ่ 2

ถ่ายหัวเชือกน้ำส้มจากโอง ก
และ ค ลงในอ่องใหญ่ 2




วันที่ 32 ของการทดลอง

ภาพที่ 4-3 วิธีขยายหัวเชื้อน้ำส้มสายชูในโอง ก, ข และ ค และ ขยายหัวเชื้อเหล้าในโอง 1, 2 และ 3




วันที่ 35 ของการทดลอง
ภาพที่ 5-3 วิธีขยายหัวเชื้อเหล้า
ในโองใหญ่ 3



วันที่ 39 ของ การทดลอง


ภาพที่ 6-3 หมักน้ำส้มสายชูในโถงใหญ่ 3

ถ่ายหัวเชือกน้ำส้มจากโถง ก
และ คล ในโถงใหญ่ 3




วันที่ 42 ของการทดลอง

ภาพที่ 4-4 วิธีขยายหัวเชื้อน้ำส้มสายชูในโอ่ง ก, ข และ ค และขยายหัวเชื้อเหล้าในโอ่ง 1, 2 และ 3



วันที่ 45 ของการทดลอง

ภาพที่ 7 วิธีข้ายาหัวเชื้อเหล้า ในโลงใหญ่ 4



วันที่ 49 ของการทดลอง

ภาพที่ 8 หมักน้ำส้มสายชูในโ่องใหญ่ 4

ถ่ายหัวเชือกน้ำส้มจากโ่อง ก.
ข. และ ค. ลงในโ่องใหญ่ 4




สรุปตารางเวลาการผลิตน้ำส้มสายชูนมกจากน้ำตาลโดยนัดที่ถูกตุณอนามัย ตามภาพด้านๆ

วันที่ ^{1/}	ໂອ່ງ ກ.	ໂອ່ງ ຂ.	ໂອ່ງ ຄ.	ໂອ່ງ 1	ໂອ່ງ 2	ໂອ່ງ 3	ໂອ່ງໄຫຍ່ 1-1	ໂອ່ງໄຫຍ່ 2-1	ນໍາຕາຄສດ (ປີບ)
1	ກາພທີ 1								$\frac{1}{2}$
4	ກາພທີ 2			ກາພທີ 2	ກາພທີ 2	ກາພທີ 2			$1 \frac{1}{2}$
8	ກາພທີ 3			$1 \frac{1}{2}$					
11						ກາພທີ 4	ກາພທີ 4 ($1 \frac{1}{2}$ ປີບ)		$1 \frac{1}{2}$
12	ກາພທີ 5				1				
15	ກາພທີ 6	ກາພທີ 6	ກາພທີ 6			ກາພທີ 6			$1 \frac{1}{2}$
16				ກາພທີ 7	ກາພທີ 7		ກາພທີ 7 (3 ປີບ)		$1 \frac{1}{2}$
19				ກາພທີ 8	ກາພທີ 8		ກາພທີ 8 (4 $\frac{1}{2}$ ປີບ)		$1 \frac{1}{2}$
20						ກາພທີ 9	ກາພທີ 8 (5 $\frac{1}{2}$ ປີບ)		1
23	ກາພທີ 10		ກາພທີ 10 (8 ປີບ)		$1 \frac{1}{2}$				
24						ກາພທີ 11		ກາພທີ 11 (1 $\frac{1}{2}$ ປີບ)	$1 \frac{1}{2}$
27	ກາພທີ 12			$1 \frac{1}{2}$					
28								ກາພທີ 13 (3 ປີບ)	$1 \frac{1}{2}$
31				ກາພທີ 14	ກາພທີ 14	ກາພທີ 14		ກາພທີ 14 (5 ປີບ)	$\frac{1}{2}$
35	ກາພທີ 15	ກາພທີ 15	ກາພທີ 15					ກາພທີ 15 (8 ປີບ)	

^{1/} ດາວໂຫຼດລອງ


วันที่ 1 ของการทดลอง

ภาพที่ 1 วิธีใช้ลูกแพ้งเหล้า




วันที่ 4 ของการทดลอง

ภาพที่ 2 วิธีขยายหัวเชื้อเหล้าจากโอง ก ลงในโอง 1,2 และ 3
และวิธีใส่ลูกปั่งน้ำส้มสายชู




วันที่ 8 ของการทดลอง

ภาพที่ 3 วิธีขยายหัวเชือกน้ำล้มสายชู โดยเพิ่มโออง ข และ ค




วันที่ 11 ของการทดลอง

ภาพที่ 4 วิธีขยายหัวเชื้อเหล้าในโ่องใหญ่ 1 (ครั้งที่ 1)




วันที่ 12 ของการทดลอง

ภาพที่ 5 วิธีขยายหัวเชื้อน้ำส้มสายชู ในโอง ก, ข และ ค




เติมน้ำตาลสดที่ต้มเดือด 30 นาที มีความหวาน 12-14 บริกช์,
และทิ้งให้คุณก่อนเทใส่ โอง 1 และ 2 โองละ $\frac{1}{2}$ ปั๊บ



วันที่ 15 ของการทดลอง
ภาพที่ 6 วิธีขยายหัวเขื่อนน้ำสัมสายชู ในอ่อง ก, ข และ ด




เติมนาฬาลสต์ที่ต้มเตือด 30 นาที มีความหวาน 12-14 บริกช์,
และพึงให้อุ่นก่อนเทใส่ โถง 3 จำนวน $\frac{1}{2}$ ปืน




วันที่ 16 ของการทดลอง

ภาพที่ 7 วิธีขยายหัวเชือกเหล้าในโถ่งใหญ่ 1 (ครั้งที่ 2)




วันที่ 19 ของการทดลอง

ภาพที่ 8 วิธีขยายหัวเชือเหล้าในโถงใหญ่ 1 (ครั้งที่ 3)




วันที่ 20 ของการทดลอง


ภาพที่ 9 วิธีขยายหัวเชือเหล้าในโองใหญ่ 1 (ครั้งที่ 4)



วันที่ 23 ของการทดลอง
ภาพที่ 10 หมักน้ำส้มสายชูในโอ่งใหญ่ 1



วันที่ 24 ของการทดลอง ภาพที่ 11 วิธีขยายหัวเชื้อเหล้าในโถ่ใหญ่ 2 (ครั้งที่ 1)




วันที่ 27 ของการทดลอง

ภาพที่ 12 วิธีขยายหัวเชื้อน้ำส้มสายชู ในโถง ก, ข และ ค และขยายหัวเชื้อเหล้าในโถง 1, 2 และ 3



เติมน้ำตาลสดที่ทั้งเดือด 30 นาที มีความหวาน 12-14 บริกซ์,
พิ่งให้อุ่นก่อนเทใส่ลงในโถง 1, 2 และ 3 โถงละ $\frac{1}{2}$ ปีบ




หมักทิ้งไว้ 8 วัน (ต่อภาพที่ 15)

หมัก 4 วัน (โถง 3 ต่อภาพที่ 14)

วันที่ 28 ของการทดลอง


ภาพที่ 13 วิธีขยายหัวเชื้อเหล้า (ยีสต์สต) ในโองใหญ่ 2 (ครั้งที่ 3)



หมักไว้ 3 วัน (ต่อภาพที่ 14)


วันที่ 31 ของการทดลอง

ภาพที่ 14 วิธีขยายหัวเชือเหล้าในโ่องใหญ่ 2 (ครั้งที่ 2)



วันที่ 35 ของการทดลอง

ภาพที่ 15 หมักน้ำส้มสายชูในโถงใหญ่ 2





ข้อควรระวังในการทำน้ำส้มสายชูหมักจาก ตalałトイนดที่ถูกสุขอนามัย

- ① กากชนะที่ใช้หมักเหล้าและหมักน้ำส้ม สายชูต้องล้างและข่าเชื้อจุลินทรีย์ให้หมดก่อนนำมาใช้
- ② น้ำตาลトイบดที่นำมาหมักเป็นน้ำส้มสายชูหมัก ต้องต้มเพื่อข่าเชื้อจุลินทรีย์ให้หมด โดยต้มนานไม่ต่ำกว่า 30 นาที
- ③ บ้าตาลที่ต้มแล้วนี้ต้องกึ้งให้อุ่นก่อน ใส่เชื้อจุลินทรีย์ หรือลูกปีงเหล้า หรือนำไปใส่ในหัวเชื้อเหล้าเพื่อขยายปริมาณหัวเชื้อเหล้า
- ④ ปากกากชนะที่ใช้หมักเหล้าต้องสะอาดไม่มีน้ำตาลเปื้อน เพราะจะทำให้ราดำเนินได้และจะให้ผลไม่ดีในการทำเหล้า
- ⑤ กากชนะที่ใช้หมักเหล้าและหมักน้ำส้มสายชู ควรเป็นกากชนะดับฉุดกัน
- ⑥ การนำเชื้อเหล้าไปขยายต่อต้องหมักมาแล้วอย่างน้อย 3 วัน
- ⑦ การหมักหัวเชื้อน้ำส้มสายชู ควรหมักนานอย่างน้อย 7 วัน ก่อนนำไปหมักในโองไหกุ

การควบคุมความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูหมัก



ตรวจสอบหาความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูหมักดังแต่ถ่ายน้ำส้มสายชูลงในโถงใหญ่ ทำการวัดความเปรี้ยวทุก 3 วัน จนได้ความเปรี้ยวที่ต้องการ โดยใช้เครื่อง % กรด ในรูปของกรดน้ำส้ม โดยนำตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร เจือจางด้วยน้ำกลั่น 5 มิลลิลิตร เติมสารละลายฟีนอฟทาลีน 3 หยด แล้วใส่ไฮเกรตด้วยสารละลายน้ำตาล 0.1 นอร์มอล โซเดียมไฮดรอกไซด์ จนกระหั่งถึงจุด end point สีชมพู แล้วบันทึกปริมาตรโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้

$$\text{ปริมาณ กรดแอกซิคิค} = \frac{N \times V \times 60.1 \times 100}{1000}$$

(กรัมต่อ 100 มล.)

N = ความเข้มข้นน้ำตาล 0.1 N NaOH

V = จำนวนมิลลิลิตรของสารละลายน้ำตาล 0.1 N NaOH



การหยุดการทำงานของเชื้อแมกน้ำส้มสายชูแมก จากสารเคมีในน้ำส้มสายชูใส่

สามารถดำเนินการที่มีกรดและดิบ ปริมาณ 5 % นัยน์การทำงานของเชื้อแมกและทำให้น้ำส้มสายชูแมกใส่ได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 โดยใช้สารเคมี

คุณน้ำส้มสายชูแมกฯ ด้านบนจากโถ่ เนพะส่วนใส่ส่วนพลาสติกที่ให้เต็มถังโดยไม่ให้มีฟองอากาศเหลืออยู่ และใส่โพแทสเซียมเมทาไบชัลไฟต์ (KMS) 100 ส่วนในล้านส่วน (ppm)

ตั้งน้ำส้มสายชูแมกที่หยุดการทำงานของเชื้อแมกน้ำส้มสายชูทึบไว้ 3 เดือนขึ้นไปให้ตกลงกัน แล้วคุณส่วนใส่เก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิทก่อนนำไปกรองด้วยเครื่องกรองน้ำส้มสายชูทันที หรือบรรจุภาชนะขายปลีก

วิธีที่ 2 โดยใช้ความร้อน

นำน้ำส้มสายชูแมกที่ได้ผสมไว้เข้าไปในภาชนะ (ไข่ขาว 1 ฟอง ต่อน้ำส้มสายชู 10 ลิตร) ตั้งไฟและคนตลอดเวลาจนอุณหภูมิถึงประมาณ 80 °C. แล้วปิดแก๊สและปิดฝาตึ้งทึบไว้ 1 วัน เพื่อตกลงกัน ก่อนคุณส่วนใส่เก็บใส่ภาชนะพลาสติกที่ทนกรดให้เต็ม "ไม่มีอากาศเหลืออยู่" และปิดฝาให้สนิท ตั้งทึบไว้รอการบรรจุขายหรือจะนำไปบรรจุเพื่อขายทันทีได้

การบรรจุน้ำส้มสายชูแมก

สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1. แบบไม่ผ่านเครื่องกรอง


นำน้ำส้มสายชูส่วนใส่ที่ผ่านการหยุดการทำงานของเชื้อแมกน้ำส้มสายชู และการทำให้ใสแล้วด้วยวิธีที่หนึ่งที่กล่าวมาแล้วนี้ มาบรรจุในขวด PET ที่ผ่านการฆ่าเชื้อขวดด้วยน้ำสะอาดผสมโพแทสเซียมเมทาไบชัลไฟต์ (KMS) 100 ส่วน ในล้านส่วน (ppm) ให้เต็มขวด ปิดฝา ให้สนิท

วิธีที่ 2. แบบผ่านเครื่องกรอง

นำน้ำส้มสายชูที่ผ่านการหยุดการทำงานของเชื้อหมักน้ำส้มสายชูและการทำให้ใสกรองที่มีความละเอียด 0.2 ไมครอน แล้วบรรจุใส่ขวดแก้วที่มีเชือกุลินทรี โดยการต้มขวดแก้วในน้ำเดือดนานอย่างน้อย 2 นาที นำขวดขึ้นจากน้ำเดือด เทน้ำร้อนออกให้หมดจากขวด เพื่อให้ขวดแห้งบรรจุน้ำส้มสายชูหมักทันที การถอดไส้กรองล้างน้ำสะอาดทุก $1\frac{1}{2}$ ชม. หรือเมื่อไส้กรองอุดตัน

การล้างไส้กรอง

1. วิธีล้างทำความสะอาดเครื่องกรองก่อนใช้งาน ทำโดยไอลาราลัยโซเดียม เม็ด้าใบซัลไฟต์ 2 % ออกให้หมดโดยปั๊มน้ำผ่านระบบกรองทุกส่วนของเครื่องกรองประมาณ 15 นาที ตรวจสอบว่าสารลาราลัยโซเดียมมาใบซัลไฟต์ไม่ตกค้างด้วยกระดาษวัด pH (ให้น้ำออกและน้ำเข้มีค่า pH เท่ากัน) ทำการถ่ายน้ำออกจากระบบกรองให้หมดแล้วจึงเริ่มกรองน้ำส้มสายชู



2. วิธีล้างทำความสะอาดเครื่องกรองหลังใช้งาน ทำได้โดยถ่ายน้ำส้มสายชูหมักที่ค้างในเครื่องออกให้หมดและถอดไส้กรองขนาด 0.2 ไมครอน ออกมาล้างข้างนอกให้ปั๊มน้ำเพื่อล้างระบบไส้กรองขนาด 1 และ 0.45 ไมครอนให้หมดกรดน้ำส้มสายชูโดยปั๊มน้ำทิงนาน 15-20 นาที ตรวจสอบว่าได้ล้างกรดน้ำส้มสายชูหมดแล้วโดยการ

วัด pH และ/หรือ % กรดน้ำส้ม จากนั้นเตรียมสารโซเดียมเมทาไบซัลไฟต์ 2 % จำนวน 13 ลิตร เพื่อปั๊มผ่านระบบกรอง ประมาณ 10 นาทีและแซฟ์ไซกรองไว้ (ควรเปลี่ยนสารละลายใหม่ทุก 1 เดือน) เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อจุลทรรศ์ไซกรองก่อนทำการกรองครั้งต่อไป

จากการศึกษาองค์ประกอบของหัวใจน้ำส้มสายชูมักจากตาลโตนดกับน้ำส้มสายชูมักจากแอปเปิล เปรียบเทียบได้ดังนี้

ตาราง ผลการวิเคราะห์น้ำส้มสายชูมักจากตาล โตนดกับน้ำส้มสายชูมักจากแอปเปิล

รายการวิเคราะห์	น้ำส้มสายชูมักจากตาลโตนด	น้ำส้มสายชูมักจากแอปเปิล
ความชื้น, กรัม/100 กรัม	97.57	96.62
โปรตีน, กรัม/100 กรัม	0.13	0.05
เต้า, กรัม/100 กรัม	0.29	0.17
ไขมันทั้งหมด, กรัม/100 กรัม	0.0003	0.0006
กาภ, กรัม/100 กรัม	0.13	0.05
คาร์โบไฮเดรต, กรัม/100 กรัม	1.97	3.10
เอทิลแอลกอฮอล์, ร้อยละ โดยประมาณ	0.06	0.0067
เมทิลแอลกอฮอล์, มิลลิกรัม/ลิตร	ตรวจไม่พบ	71.31
โพแทสเซียม, มิลลิกรัม/กิโลกรัม	0.11	823.18
แทนนิน, มิลลิกรัม/100 กรัม	58.65	45.67
เพคติน	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

ที่มา : ศูนย์ทดสอบและมาตรฐานวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย



ຝ້າຍເທກໂນໂລຢີວາຫາດ

ສາທັບນົວຈີຍວິທຍາຄາສັດຮ່ວມເທກໂນໂລຢີແຮ່ງປະເທດໄທ (ວວ.)

ໄດ້ຮັດກຳແນະນຳການຜົລືຕໍ່ນ້ຳສັນສ້າຍຊູ້ເມັກຈາກຕາລໂຕນດ
ຖຸກສຸຂອນນາມຍີ ມີຄວາມເປີເຍວົງຄົງທີ່ ໄນມີຄວາມເປີເຍວົງຄົງທີ່
ໄດ້ມາຕະຫຼາດສ້າງຕາມມາຕະຫຼາດສ້າງຜົລືຕໍ່ກົມທຸນ (ມ.ຜ.ຊ.) ແລະ
ມາຕະຫຼາດຂອງສໍານັກງານຄະນະກຽມກາຮອາຫາຣແລະຍາ (ອຍ.) ກັບ
ກຸລຸ່ມແມ່ນ້ຳເກມເກມຕະຫຼາດສ້າງຕາມມາຕະຫຼາດສ້າງຜົລືຕໍ່ກົມທຸນ
ຈັງຫວັດສັງຂລາ

ດັ່ງນັ້ນທ່ານທີ່ສັນໃຈຈັດຕໍ່ນ້ຳສັນສ້າຍຊູ້ເມັກຈາກຕາລໂຕນດ ມາໄວ້
ຮັບປະການສາມາຮັດຕິດຕ່ອໄດ້ທີ່ກຸລຸ່ມແມ່ນ້ຳເກມເກມຕະຫຼາດສ້າງຜົລືຕໍ່ກົມທຸນ
25/1 ແມ່ນ້ຳ 3 ຕຳບລຮໍາແດງ ວິທະຍາໄລ ສັນຕະພາບ ຈັງຫວັດສັງຂລາ
ໂທ. (074) 369236, 06 288 6270



ស្តីពីរាងការ កំណែន័យសំមសាបុរិយ៍ រាជន័យរាងការពីពួនទេ



ແກງສົ່ມປັກເປີໄຕ ມີອື່ອ ແກງເຫຼືອງ



ສ່ວນປະກອນ

1. ນ້ຳ	1 ດີຕຣ
2. ນ້ຳສົ່ມສາຍໜູ້ໝັກຈາກຕາລ ໂໂທນດ	6 ຊ.ຕ.
3. ນ້ຳປາ (ຕរາຕາຊົ່ງ)	5 ຊ.ຕ.
4. ນ້ຳຕາລອ້ອຍແວ່ນ (ໃໝ່)	1 ກືອນ
5. ເຄື່ອງແກງສົ່ມປັກເປີໄຕ	3 ຊ.ຕ.
6. ປລາຖຸ	4 ຕັວ
ແຮ້ອທົ່ວງປລາກະພງ/ເກົ່າ	250 ກຣັມ
7. ພຶກເຈິຍາ	1 ລູກ
8. ຜັກບູ້ງ	1 ກຳ

วิธีทำ

1. ละลายเครื่องแกงส้มที่ต้มไว้ในน้ำ ใส่น้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนด น้ำปลา และนาตาดาค

2. ต้มให้เดือด แล้วใส่พิกเบี้ยว เมื่อพิกเบี้ยวใส แล้วใส่ปลาทูทึ้งตัวไม่ต้องหัน และใส่ผักบุ้ง

เครื่องแกงส้มปักษ์ใต้

ส่วนประกอบ

1. กระเทียม	15 กก.
2. เกลือเม็ด	1 ช.ต.
3. พริกขี้หนูสด (แดง หากชอบเผ็ดให้เพิ่มพริกสด)	9 เม็ด
4. กะปิ	6 ช.ต.
5. ขมิ้น ขาวท่อนละ 2 นิ้ว	3 ท่อน

วิธีทำ

นำส่วนผสมประกอบด้วย กระเทียม เกลือเม็ด พริกขี้หนูสด กะปิ ขมิ้น มากลูกเคล้าด้วยกันแล้วบดออกมารีบเป็นเครื่องแกงหรือโขลกเครื่องแกงให้ละเอียด



ตั่มส้มปีกเป็ดไก่



ส่วนประกอบ

1. ปลาทูสด	4-5 ตัว (300 กรัม)
2. ตะไคร้ตันใหญ่	4 ต้น (70 กรัม)
3. หัวหอมแดง	5-6 หัว (30 กรัม)
4. กระเทียมกลีบใหญ่	6 กลีบ (25 กรัม)
5. ขมิ้นท่อนยาว 4 นิ้ว (หรือมากกว่าได้ตามชอบ)	1 ท่อน (11 กรัม)
6. ใบมะกรูด	10 ใบ
7. พริกปี๊บหնุ้ยสด	10 เม็ด
8. น้ำส้มสายชูหมักจากตาล โถนด	1/2 ถ้วยตวง (80 กรัม)
9. เกลือป่น	1 ช.ช. (12 กรัม)

10. น้ำปลา	2 ช.ต.
11. น้ำตาลโคนดหรือน้ำตาลปีบ	1 ช.ช. (6 กรัม)
12. น้ำตาลทราย	2 ช.ต. (30 กรัม)
13. น้ำ	1.5 ลิตร (30 กรัม)
14. เห็ดฟาง	150 กรัม

วิธีทำ

- ใส่น้ำ 2 ลิตร ตะไคร้ทุบ หомแคงทุบ กระเทียมทุบ ขมิ้นทุบ และใบมะกรูดฉีก
- ตั้งไฟให้น้ำเดือดใส่ปลาทูที่ล้างทำความสะอาดแล้วหั่นหัวหรือจะหั่นครึ่งตัวก็ได้ ลงในหม้อพร้อมน้ำส้มสายชูหมักที่เหลือให้หมด แล้วใส่เกลือน้ำปลา น้ำตาลทราย น้ำตาลโคนด หรือน้ำตาลปีบ เห็ดฟาง
- ต้มต่ออีกประมาณ 1 นาที ใส่น้ำส้มสายชูหมักที่เหลือให้หมด แล้วใส่เกลือน้ำปลา น้ำตาลทราย น้ำตาลโคนด หรือน้ำตาลปีบ เห็ดฟาง
- ต้มต่อจนเห็ดสุกพร้อมหั่งชิมรสและปรุงรสเพิ่มตามชอบ ยกลงจากเตารับประทานได้



ผัดลองหลากระสี



ส่วนประกอบ

แครอทหันฟอย	50 กรัม
ผักบุ้งจีน, ไทย หันฟอย	60 กรัม
ก้านกะนาหันฟอย	50 กรัม
ถั่วงอก	70 กรัม
ถั่วฝักยาวหันฟอย	70 กรัม
กะหล่ำปลี หันฟอย	70 กรัม
แตงกวาหันฟอย	80 กรัม
น้ำส้มสายชูหมักจากตลาดโขนด	100 กรัม
เกลือ โซเดียม	2 กรัม
น้ำตาลทราย	80 กรัม

วิธีทำ

1. นำ น้ำส้มสายชู + เกลือไอโอดีน + น้ำตาลทราย ผสมรวมกันตั้งไฟ พอน้ำตาลทรายละลายยกลงตั้งทิ้งไว้ให้เย็น (ตามปกติทางภาคใต้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมตั้งไฟ)
2. นำ แครอท + ผักบุ้ง + ก้านคะน้า + ถั่วงอก + ถั่วฝักยาว + กะหล่ำปลี + แตงกวา ผสมรวมกัน
3. นำ ข้อ 1 คือๆ ราดลงบนข้อ 2 ผสมรวมกัน ตั้งทิ้งไว้ให้นานประมาณ 1 - 2 ช.ม. จึงนำมารับประทานได้ (เพื่อต้องการให้รสชาติกลมกล่อม)

หมายเหตุ ผักดองหลายสีทางภาคใต้นิยมรับประทานกับข้นมีน้ำยาปักษ์ใต้ (รับประทานจำนวนประมาณ 15 – 20 คน)



ນໍາລືມສຸກີ່ປາກີ່



ສ່ວນປະກອບ

ກະເທິມດອງ	50 ກຣັມ
ເຕົ້າຫຼູຍ້	50 ກຣັມ
ພຣິກບີ່ຫຸ່ງ	15 ກຣັມ
ຈາບາວຫົ່ອງຈາດໍາ	2 ກຣັມ
ນໍ້າມັນງາ	15 ກຣັມ
ນໍ້າຕາລທຣາຍແಡັງ	30 ກຣັມ
ນໍ້າສິ້ນສາຍຫຼູ້ໜັກາ	30 ກຣັມ
ເກລື້ອ	2 ກຣັມ
ນໍ້າຕົມສຸກ (ເດືອດ)	50 ກຣັມ

ວິທີ່ກຳ

ນໍາສ່ວນຜສມທີ່ໜ້າມດົບຄະເອີຍດ ຍກເວັ້ນນໍ້າມັນງາແລະຈາດໍາຫົ່ອງຈາວ (ໂຮຍໜ້າ) ເນື່ອບຄະເອີຍດີແລ້ວ ເຕີນນໍ້າມັນງາບດໃຫ້ເຂົ້າກັນ ອິມຣສ່າທິຕາມຊອບໄຈ (ສໍາຮັບຮັບປະກາດ 5-6 ດວຍ)

ສັລັດນ້ຳຂັນ (ໄມ່ມາໄຈ)



ສ່ວນປະກອບ

1. ນໍ້າມັນສັລັດ (ທີພູ່)	350 ກຣັມ
2. ນໍ້າສິ້ນສາຍຫຼຸມກັກ	250 ກຣັມ
3. ນມ້ຳຂົ້ນຫວານ	300 ກຣັມ
4. ນມ້ຳຂົ້ນຈຶດ	150 ກຣັມ
5. ນໍ້າຕາລທຣາຍບຄລະເວີຍດ	80 ກຣັມ
6. ເກລືອປິ່ນ	10 ກຣັມ
7. ພຣິກໄທຢັ້ນ	3 ກຣັມ
8. ຄັສຕາຮົດ	3 ກຣັມ

ວິທີທຳ

1. ນຳ ຊື້ອ 5-8 ພສມຮວມກັນໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງປິ່ນໃຫ້ເຂົາກັນ ໄສ່່ນມ້ຳຂົ້ນຫວານ ສລັບກັບ ນໍ້າສິ້ນສາຍຫຼຸມກັກ ແລະ ນມ້ຳສັລັດ ພສມໃຫ້ເຂົາກັນ
2. ບຽບໃສ່ລົງໃນກາຫະນະທີ່ເຕີຣີມໄວ້ແລະ ເກີນໄວ້ໃນຕູ້ເຢັ້ນ

ສລັດນໍາໄສ



ສ່ວນປະກອບ

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. ຜອສຄົມານ (ຜອສຫຼຸງປຸ່ນ) | 2 ຊ.ຕ. |
| 2. ນໍ້າສິນສາຍຫຼຸ້ມກຈາກຕາລ ໂຕນດ | 2 ຊ.ຕ. |
| 3. ນໍ້າມັນນະກອກ (ນໍ້າມັນນະກອກ) | 1 ຊ.ຕ. |
| 4. ນໍ້າຜົງ | 1 ຊ.ຕ. |

ວິທີທຳ

ນໍ້າສ່ວນປະກອບທຸກອ່າງພສມຮວມກັນ ແລະ ຕື່ໃຫ້ເຂົ້າກັນ ກ່ອນນຳໄປຮາດຜັກສລັດ
ສາມາຮັດເຕີມຈາດຳ, ຈາຂາວ ທີ່ໄວ້ພຣິກໄທຢາດຳ ຕາມຕ້ອງການ

ปลาต้มส้ม-ชีวิว



ส่วนประกอบ

1. ปลากรอบอก	1 กก.
2. กระเทียม	4-5 กลีบ
3. กะหล่ำปลี	7-8 ใบ
4. ซอสญูเหาทอง	4 ช.ต.
5. น้ำส้มสายชูหมัก	4 ช.ต.
6. นำ้ตาลแ冤่นหรือนำ้ตาลทรายแดง	1-2 แ冤น/2 ช.ต.
7. นำ้เปล่า	8 ช.ต.
8. ตะไคร้	1 ตัน
9. ใบมะกรูด	4-5 ใบ

วิธีทำ

1. ปลาล้างน้ำ 1 ครั้ง ขอดเกลือปลา ผ่าท้องเอาไส้ออก หั้นเป็นชิ้น 2-4 ชิ้น
2. กระเทียม ปอกเปลือกล้างสะอาด ทุบพอแตก แกะใบกะหล่ำปลีแล้วหั้น เป็น 2-4 ชิ้น
3. นำกระเทียม ตะไคร้ ใบมะกรูด กะหล่ำปลี ปลา เติมน้ำพอท่วมปลา ยกตั้งไฟ (ปิดฝาหนึ่อประมาณ 15 นาที) พอดีดื่นใส่เกลือ นำ้ตาลแ冤่น นำ้ส้มสายชูหมัก ซอสญูเหาทอง ชิมดูรส

ການໃຊ້ປະໄມ່ເພື່ອ

ລາກນໍາສົ່ມສາຍຫຼຸ້ມກລາກທາລໄຫວ່າດ

ນໍາສົ່ມສາຍຫຼຸ້ມກຈາກຕາລໄຫວ່າດ ນອກຈາກນໍາໄປໃຊ້ດ້ານປຽບອາຫານແລ້ວຍັງໃຊ້ປະໄມ່ເພື່ອນີ້ດ້ານອື່ນ ເຊັ່ນໃນດ້ານການທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງໃຊ້ແລະອຸປະກອນທົ່ວາໄປ (ໂດຍໃຊ້ອັດຕາສ່ວນຮະວ່າງນໍາສົ່ມສາຍຫຼຸ້ມກ : ພົງຟູ ເປັນ 1: 1)

ຂໍ້ຕອນໃນການທຳຄວາມສະອາດ

ວິສດຸແລະອຸປະກອນ

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. ກະລະມັງ | 1 ໄບ |
| 2. ຜ້າບັນຫຼຸງຮູ້ອີ້ນ | 2 ຜື້ນ |
| 3. ຊ້ອນສຳຫັນຄົນ | 1 ກັນ |
| 4. ນໍາສົ່ມສາຍຫຼຸ້ມກ | |
| 5. ພົງຟູ | |

ສ່ວນຜສມ



- | | |
|------------------|----------|
| ນໍາສົ່ມສາຍຫຼຸ້ມກ | 250 ກຣັມ |
| ພົງຟູ | 250 ກຣັມ |

ວິທີທຳ

1. ນຳນໍາສົ່ມສາຍຫຼຸ້ມກ ແລະ ພົງຟູ ຜົມຮັບຮັບກັນ ລັກນໍາທີ່ເກີດບື້ນຄື່ອຈະເກີດພອງສື່ບາວຕັ້ງທີ່ໄວ້ນານປະມາດ 5 ນາທີ ຈົນກະທຳພອງໜົມດ
2. ນຳຜ້າບັນຫຼຸງຮູ້ອີ້ນ ຈຸ່ນລົງໃນນໍາສົ່ມສາຍຫຼຸ້ມກທີ່ຜົມກັບພົງຟູ ຈຸ່ນພອ່ມາດໆ ເຮັດບຣິເວນທີ່ສັກປຽບອອກໃຫ້ໜົມດ ແລ້ວຈຶ່ງໃຊ້ຜ້າແທ່ງເຊື້ອດ້າວັນກັບພົງຟູ ທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ຫັດ ຄື່ອວິສດຸຫລັງຈາກການໃຊ້ຈະເກີດຄວາມໄສ ຂາວສະອາດນໍາໃຊ້ວິສດຸ

หมายเหตุ ส่วนผสมดังกล่าวใช้กับวัสดุที่สกปรกหรือมีคราบติดล้างไม่ออก เช่น

- คราบปูนเย็น
- ฝาผนัง
- ถ่านนาฬิกา
- คอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์
- กระดานเขียนไวท์บอร์ด (whiteboard)
- มีดสแตนเลสที่ทำความสะอาดแล้วยังมีคราบติดอยู่
- ถุงกันความร้อนที่ลอกไม่หมด
- ลบรอยปากกาลูกลื่นที่ติดเหลือฝ้า



ข้อเสียของน้ำส้มสายชูหมัก คือจะมีกลิ่นหมัก เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วควรทิ้งไว้สักพัก จึงจะเก็บไว้ในที่เดิมได้

ເວັກສາຄວ້າງອີງ

ຕະຫຼາດ ຕະຫຼາດ ໃນສັງຂລາແລະ ແນວທາງການເກື່ອງຮັກຍານໍ້າສິ້ນສາຍໜູ້ມັກຈາກ
ຕະຫຼາດໂຕນດ. ຮາຍງານລັບນີ້ທີ່ 1, ໂຄງກາຣວິຊຍໍທີ່ ກ.44-01, ໂຄງກາຣຍ່ອຍ
ທີ່ 2. ກຽມເທພາ: ສຕາບັນວິຊຍົວທາສາສຕ໋ຣແລະເທກໂນໄລຍືແໜ່ງ
ປະເທດໄທຢ.42 ໜ້າ

ຕະຫຼາດ ຕະຫຼາດ ສຸວົມພາແລະ ຄຜນະ. 2545. ວິຊີການພລິຕີແລະ ເກື່ອງຮັກຍານໍ້າສິ້ນສາຍໜູ້ມັກ
ຈາກຕະຫຼາດໂຕນດ. ຮາຍງານລັບນີ້ທີ່ 2, ໂຄງກາຣວິຊຍໍທີ່ ກ.44-01, ໂຄງກາຣ
ຍ່ອຍທີ່ 2. ກຽມເທພາ: ສຕາບັນວິຊຍົວທາສາສຕ໋ຣແລະເທກໂນໄລຍືແໜ່ງ
ປະເທດໄທຢ.75 ໜ້າ

ຕະຫຼາດ ຕະຫຼາດ ສຸວົມພາແລະ ຄຜນະ. 2546. ການພລິຕີນໍ້າສິ້ນສາຍໜູ້ມັກຈາກນໍ້າຕະຫຼາດໂຕນດ
ທີ່ ຖຸກອນນຳມີໂຄຍກລຸ່ມແມ່ບ້ານກ່າຍຕຣ. ຮາຍງານລັບນີ້ທີ່ 3, ໂຄງກາຣວິຊຍໍ
ທີ່ ກ.44-01, ໂຄງກາຣຍ່ອຍທີ່ 2. ກຽມເທພາ: ສຕາບັນວິຊຍົວທາສາສຕ໋ຣ
ແລະເທກໂນໄລຍືແໜ່ງປະເທດໄທຢ.144 ໜ້າ

ຖຸ່ງໜ້າວ້າ, ສມຍຄ. 2527. ຕະຫຼາດໂຕນດ. ພຶ້ສາສຕ໋ຣສາສັນ. ປີທີ່ 6. (4), ກຣກກູາຄມ –
ສິງຫາຄມ : 32-38.

ເທຣນຸລູ່, ກີ່ຍ. 2526. ຮະບນການປັບປຸງທີ່ດິນເພື່ອການເກຍຕຣແລະ ວິວັດນາກາຣ
ໃນຊ່ວງທີ່ເພິ່ນມາຂອງ ສທິງພຣະ. ໂຄງກາຣວິຊຍົວທາສາສຕ໋ຣ
ການເກຍຕຣ, ຄມະທວັພຍາກຮຽມາທີ ມາຮວິທາລັບສັງຂລານຄຣິນທີ່.
ບຸນນາຄ, ປີຈຸ່ງສະ. 2511. ປາລີ່ມ. ແພຣີພິທຍາ, ພຣະນົມ. 273 ໜ້າ

ທລວງສມານວນກິຈ. 2477. ການທຳນໍາຕະຫຼາດໂຕນດ-ນະພຣິວາ. ກຣມເກຍຕຣ
ກະທຽວງເສຽມຮູກກາຣ, ໂຮງພິມເຟັເລີມເລື່ອ, ພຣະນົມ

Kovoor, A. 1983. The Palmyra Palm : Potential and Perspectives FAO Plant
Production and Protection. Paper 52, Food and Agriculture
Organization of the United Nations, Rome.


การแสดงนวากที่ 1



គន្លេដ្ឋានឱការវិវ័យ

ນໍາສົ່ມສາຍຫຼຸ້ມກວາກທາລໄຕນດ

1. นางสุวรรณ	ศรีสวัสดิ์	หัวหน้าโครงการ
2. นายสมพงษ์	สุกแสลงเปล่ง	ผู้ร่วมโครงการ
3. นายอินทรารุช	ณัตรเกณ	ผู้ร่วมโครงการ
4. นางสาวปุณณภา	บุญยักษ์	ผู้ร่วมโครงการ
5. นางพรวัตtra	ศรีนรคุตร	ผู้ร่วมโครงการ
6. นายคำรงชัย	ลิทธิสำอางค์	ผู้ร่วมโครงการ
7. นางสาวยุพารถ	ทับนาโคก	ผู้ร่วมโครงการ
8. นายต่อศักดิ์	นวลไย	ผู้ร่วมโครงการ
9. นางบุญลักษณ์	ทับนาโคก	ผู้ร่วมโครงการ



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

การแสดงน้ำก๊ะ 2



ข้อปฏิบัติทั่วไปที่จำเป็นในการผลิตและการสุขาภิบาลของผู้ปฏิบัติงาน

- แต่งกายด้วยสีอ่อนๆ ที่สะอาด
- สวมหมวกปิด kep ให้มีคีดี
- ลดความร้อนระดับ ได้แก่ แหวน ต่างหู สร้อยข้อมือ นาฬิกา ส่วนสร้อยคอ ให้ลดออกหรือเก็บไว้ในเสื้อ
- ต้องถางมือและฟอกมือ หลังจากที่ออกจากการห้องส้วม และก่อนทำการผลิต โดยทำการถางมือให้สะอาดอย่างทั่วถึง เล็กซ์เด็คให้แห้งด้วยผ้าหรือกระดาษที่สะอาดหากเป็นไปได้หลังจากเช็ดมือให้แห้ง ควรฉีดเมื่อถ่ายสารละลายแลกออกอ่อต์ 70% ทุกครั้ง
- ห้ามให้ผู้ปฏิบัติงานทำการผลิตเมื่อมีแพลฟ์ หนอน ที่มือ
- ควรมีการใส่ผ้าปิดปากระหว่างปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในบริเวณที่บ่อบรุจ
- ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต หากอยู่ในบริเวณผลิต ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงาน

สุขาภิบาลของอาคารสถานที่/อุปกรณ์

- แยกบริเวณผลิตออกเป็นสัดส่วนจากบริเวณที่อยู่อาศัย
- น้ำที่ใช้ผลิตอาหารหรือสัมภาระต้องเป็นน้ำที่บริโภคได้โดยเฉพาะน้ำที่ใช้ในเครื่องคั่มที่ไม่ผ่านการต้ม เช่น น้ำส้ม น้ำมะนาว
- มีการติดน้ำดื่มป้องกันแมลง รอบอาคาร
- มีกรอบพลาสติก ป้องกันหลอดไฟ
- ควรมีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ แยกจากบริเวณที่ผลิต หรือไม่ปิดสู่บริเวณผลิต โดยตรง ต้องมีจำนวนเพียงพอ และติดตั้งอย่างถาวรมีและสนับสนุน
- จัดหาอ่างถังมือพร้อมสนับสนุนอย่างน้อย 2 ชุด ได้แก่ หน้าห้องส้วมและบริเวณที่ผลิต
- มีการกำจัดหนู แมลง และสัตว์พ่าหะอื่นๆ
- จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิด อย่างเพียงพอ
- การทำล้างอุปกรณ์ก่อน และ หลัง ทำการผลิตทุกครั้งและเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาด
- จัดให้มีทางระบายน้ำทิ้งและสิ่งโสโครกอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต
- จัดให้มีการขนขยะไปทิ้งในพื้นที่ซึ่งห่างจากบริเวณผลิต

การแสดงน้ำก๊ะ 3



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ 204) พ.ศ.2543

เรื่อง น้ำส้มสายชู

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง น้ำส้มสายชู

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับต่อไปนี้

เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักร ไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2523) เรื่อง น้ำส้มสายชู ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523

ข้อ2 ให้น้ำส้มสายชูเป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานให้ถือว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นั้นในทำนองเดียวกับน้ำส้มสายชูเป็นน้ำส้มสายชูและให้หมายความรวมถึงหัวน้ำส้มด้วย

ข้อ3 น้ำส้มสายชูแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังต่อไปนี้

(1) น้ำส้มสายชูหมัก หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำ乙醇เพิ่ม ผลไม้ หรือน้ำตาล มาหมักกับส่าเหล้าแล้วหมักกับเชื้อน้ำส้มสายชูตามกรรมวิธีธรรมชาติ

(2) น้ำส้มสายชูกลั่น หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำแอลกอฮอล์กลั่น เจื้องจาง (Dilute Distilled Alcohol) มาหมักกับเชื้อน้ำส้มสายชู หรือ เมื่อหมักแล้ว นำไปกลั่นอีก หรือได้จากการนำน้ำส้มสายชูหมักตาม (1) มาคลั่น

(3) น้ำส้มสายชูเทียม หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเอากรดน้ำส้ม (Acetic acid) มาเจือจาก

ข้อ 4 น้ำส้มสายชูหมักหรือน้ำส้มสายชูกลั่น ต้องมีคุณภาพ หรือมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

- (1) มีกรดน้ำส้มไม่น้อยกว่า 4 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร ที่ 27 องศาเซลเซียส
- (2) ตรวจพบสารปนเปื้อนได้ไม่เกินปริมาณที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - (2.1) สารหนู ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม ต่อน้ำส้มสายชู 1 กิโลกรัม
 - (2.2) ตะกั่ว ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม ต่อน้ำส้มสายชู 1 กิโลกรัม
 - (2.3) ทองแดงและสังกะสี ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม ต่อน้ำส้มสายชู 1 กิโลกรัม
 - (2.4) เหล็ก ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม ต่อน้ำส้มสายชู 1 กิโลกรัม
- (3) ไม่มีกรดน้ำส้มที่มิได้มาจากผลิตน้ำส้มสายชูหมักหรือน้ำส้มสายชูกลั่น
- (4) ไม่มีกรดกำมะถัน (Sulfuric acid) หรือกรดเรอิสระบอย่างอื่น
- (5) ไม่ไม่มีตะกอน เว็นแต่น้ำส้มสายชูหมักตามธรรมชาติ
- (6) ไม่มีหนอนน้ำส้ม (Vinegar eel)
- (7) ใช้น้ำสะอาดเป็นส่วนผสม
- (8) ให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives) ได้ ดังต่อไปนี้
 - (8.1) ซัลเฟอร์ไคลอออกไซด์ ไม่เกิน 70 มิลลิกรัม ต่อน้ำส้มสายชู 1 กิโลกรัม
 - (8.2) กรด酢อล-แอสคอร์บิก ไม่เกิน 400 มิลลิกรัม ต่อน้ำส้มสายชู 1 กิโลกรัม
- (9) มีแอลกอฮอลล์คงตัว (Residual alcohol) ไม่เกินร้อยละ 0.5
- (10) การแต่งสี ให้ใช้น้ำตาลคีเยวะใหม่หรือสีカラเมล

ข้อ 5 น้ำส้มสายชูเทียม ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

- (1) มีกรดน้ำส้มไม่น้อยกว่า 4 กรัม และไม่เกิน 7 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร ที่ 27 องศาเซลเซียส
- (2) ตรวจพบสารปนเปื้อนได้ไม่เกินปริมาณที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - (2.1) สารหนู ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม ต่อน้ำส้มสายชู 1 กิโลกรัม

- (2.2) ตะกั่ว ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม ต่อน้ำส้มสายชู 1 กิโลกรัม
(2.3) ทองแดง และสังกะสี ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม ต่อน้ำส้มสายชู 1 กิโลกรัม
(2.4) เหล็ก ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม ต่อน้ำส้มสายชู 1 กิโลกรัม
- (3) ใส่ไม่มีตะกอน
(4) ไม่มีกรดกำมะถันหรือกรดแอลิสระอย่างอื่น
(5) ไม่ใช้สี
(6) ไม่มีการแต่งกลิ่นหรือสี
(7) ใช้น้ำสะอาดเป็นส่วนผสม

ข้อ 6 ในการจำหน่ายน้ำส้มสายชูหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรดน้ำส้มห้ามแสดงคำว่า “หัวน้ำส้ม” หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน

ข้อ 7 กรดน้ำส้ม ที่จะจำหน่ายเป็นน้ำส้มสายชูเทียมต้องเจือจางให้มีคุณภาพ หรือมาตรฐานตามข้อ 5

ข้อ 8 ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าน้ำส้มสายชูเพื่อจำหน่าย ต้องปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

ข้อ 9 การใช้ภาชนะบรรจุน้ำส้มสายชู ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุ

ข้อ 10 การแสดงน้ำส้มสายชู ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก

ข้อ 11 ให้ใบสำคัญการเขียนทะเบียน捺รับอาหารหรือใบสำคัญการใช้ฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2523) เรื่อง น้ำส้มสายชู ลง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 ซึ่งออกให้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับยังคงใช้ต่อไป
ได้อีกสองปี นับแต่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 12 ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้านำส่งสายชูที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยื่นคำขอรับเลขสารบนาหารภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เมื่อได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ 8 ภายใต้ประกาศนี้ใช้บังคับ และให้คงใช้ชุดลากเดิมที่เหลืออยู่ต่อไปจนกว่าจะหมดแต่ต้องไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 13 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป




ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

กร หัพพะรังสี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ ๖ ง. ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2544)







สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
THAILAND INSTITUTE OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH (TISTR)
เทคโนโลยี 36 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 Call Center : 0 2579 3000
www.tistr.or.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อเนื่องการตามนโยบายพิเศษของรัฐ เดิมมีชื่อว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย หรือ สวป. ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506 และได้เปลี่ยนมาใช้พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 สืบเนื่องจากการจัดตั้งกรุงเทพมหานคร หรือ กรุงเทพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ISBN 974-953-424-7



9 789749 534243

ราคา 80 บาท

ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยฯ



BT16507

