




ສໍານັກພິມພົ ຈັກການຸຈົນ

ຫຼັກ ຂະຫຼາດ ລົງລົງ

615.89
: 633.88
ກວມ

ສວ່າມນຸ້ມໃຫຍ້ ວັດຊູໂທິງຄ ສວ່າມຫຼັກ
ຕໍ່ບລສຸເທພ ວ່າເກອເມືອງ ຈັງຫວັດເຮັຍໃຫ້



สมุนไพร

(ฉบับแนะนำ ป้องกัน รักษาโรคต่างๆ)



วัฒนไพร : ฉบับแนะนำ ป้องกัน รักษาโรคต่างๆที่พบในบ้านเรา
สวนสมุนไพร วัดอุโมงค์ (สวนพุทธาราม)
ตำบลลุมเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ขัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์จักรกลภูชน์
โทร. 589-6779

005649

๖๑๕.๘๙ : ๖๓๓.๘๘
กําน

พิมพ์ที่ : รุ่งแสงการพิมพ์
โทร. 437-2947
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายกิตติ สิทธิ Jin Da Ixek

24 บาท

27 ส.ค. 2531

ເປີດໃຈ

หนังสือທີ່ທ່ານດືອຍຸໃນມືອນຂະນະນີ້ ເປັນຜລງນາກຄັນຄວ້າຕ້ານ
ສມູນໄພຮອງສາວສມູນໄພຮວດອຸໂມງຄໍ ຈັງຫວັດເຊີຍໄໝ໌ ທີ່ໄດ້ຮັບກາຍອິນ
ຮັບກັນທົ່ວໄປວ່າ ມີປະສິກີຫີກີພ ສາມາດຮັກຊາໂຣຄກຍໃໝ່ເຈັບຫາຍໄດ້ ຊຶ່ງ
ສຳນັກພິມພົມມີຄວາມເຫັນວ່າ ເປັນປະໂຍໜນອ່າງມາກຈຶງໄດ້ຂອອນຸ້າມມາ
ພິມພົມແພຍພແພວ່ເພື່ອເປັນປະໂຍໜນແກ່ຄຸນທົ່ວໄປ

หนังສື່ອເລີ່ມນີ້ໄມ້ໃຊ້ເລີ່ມແຮກທີ່ເກີຍວ້ອງກັບສມູນໄພຮ ແຕ່ຈະມີພິມພົມອອກ
ມາເຮືອຍໆ ຕາມແຕ່ໂກສຈະອໍານາຍ ເພຣະວ່າສາວອຸໂມງຄໍທີ່ກຳທັນນ້າທີ່ຄັນຄວ້າ
ເກີຍກັບສມູນໄພຮຈະມີຮຽງຈານອອກມາເຮືອຍໆ ຊຶ່ງເຮົາຈະຂອອນຸ້າມນໍາມາຕີ
ພິມພົມມໍາເສນອ

ຫວັງວ່າທ່ານຄົງຈະໄດ້ຮັບປະໂຍໜນຈາກหนังສື່ອເລີ່ມນີ້ ສຳນັກພິມພົມຈຶງ
ຂອງຂອນຄຸມແກ ໄດ້ໂກສນີ້ ແລະຫວັງວ່າຄົງຈະໄດ້ຮັບກາຍອຸດຫຸນຈາກທ່ານໃນ
ໂກສຕ່ອໄປ

ສຳນັກພິມພົມຈັກກາຍຸຈນໍ

ສາ ຍະ ບັນ

ເງື່ອງ	ໜ້າ
ປວກຫວ້າ ແລະອາກາຮ	10
ປວກຫວ້າຂ້າງເຄີຍວ	10
ຢາແກ້ປວກຫວ້າ	12
ຢາຮັກໝາໂຣຄທາ	13
ຢາຮັກໝາປວກຫຼຸ	16
ຢາແກ້ປາກເປື່ອຍ	16
ຢາແກ້ລິ້ນເບີນຜ້າ	17
ຢາແກ້ປວກພື້ນ	17
ຢາຮັກໝາພື້ນແລະເໜຶອກ	18
ຢາແກ້ໂຣຄລັກນີ້ຄລັກເນີ່ຕ	18
ຢາແກ້ເຈັບຄອ	19
ໄຂ້ຫວັກ ວິຫຼນ້ອງກັນແລະຮັກໝາ	21
ຢາຮັກໝາໂຣຄຫວັກ	22
ໄອ ວິຫຼນ້ອງກັນແລະປົງນິບຕີ	23
ຢາແກ້ໄອ	24
ຢາແກ້ທອນທົກ	25
ສະອົກແລະກາຮັກໝາ	26

ยาแก้เลือดกำเดา	27
ยาแก้แพลงในช่องอกอักเสบ	28
ยาแก้ไขน้ำสีเรืองรัง	28
ยาแก้ไขน้ำสีและริดสีดวงจมูก	28
ความคันโนทิกสูง	30
ยารักษาความคันโนทิกสูง	31
ยาแก้ความคัน แก้ปวกหัวมีนัง	32
ยาแก้หัวคั้ดและลมแน่นในกระเพาะ	32
โรคเห็บชาและอาการ	34
ยารักษาโรคเห็บชา	34
ยาแก้โรคเริม งูสวัสดิ์	35
ยาแก้แพลงคลาย	36
ยาแก้แพลงเรืองรัง	36
ผื่นช้ำรุมดา และผื่นผักบัว	36
การใช้ยาสมุนไพรรักษา	37
ยาแก้กัดจากเกตีอน	38
ยาแก้ผื่นหนังผื่นคัน	39
ยาแก้งูพิษ	40

ยาแก้พิษสัตว์กัดทอย	40
แมตสตค สมานแมต	41
ยาแก้พิษนาคทะยัก	42
น้ำร้อนดวกและไฟดวก	43
โรคแพลในกระเพาะอาหารและลำไส้	44
ปวกท้องเหมือนจะเป็นบิด	46
ท้องเกิน ท้องร่วง	46
ท้องผูก	47
ท้องเตียบิกชนิกไม่มีไข้	48
ชาถูกพิการอาหารไม่ย่อย ปวกท้อง	49
ท้องชื้น ท้องอืด ท้องเพ็อ	49
ยาแก้ท้องร่วง ဓิวาท์ทกโรค	51
ปวกท้องเพราะอาหารเป็นพิษ	51
ยาแก้น้ำและอาการ	52
ริกสีควงทวาร	53
ยาแก้วริกสีควงทุวาร	55
ไข้ร้อน กระหายน้ำ	75
ยาแก้คอบอก หรือคอบโค	58
โรคเบาหวาน นึองกันรักษากษา .	58

โรคไข้	61
ต่อมถุง厴มากโกร	64
ยาบีองกันแก้ป่วยหลังปวดเอวปวดท้องข้อ	65
ยาแก้ไข้คีบเนา	66
โรคหัวใจ	67
โรคปอด	68
โรคคัน	68
โรคนิบ	69
อหิวาท์ทอกโรค	72
ยาแก้ไข้จับสั่นและอาการ	72
มาตราเรีย ไข้จับสั่น	74
ชาใบ	75
คุณประโยชน์ของมะนาว	76
คุณประโยชน์ของว่านยาสมุนไพร	83
พื้นที่ภาษาจีร (น้ำลายพังพอน)	83
ว่านรงค์ หรือจางจีก	83
ว่านไฟ-ไฟต์แครง-เล้งเกียว	84
คำไทย-คำเมือง-คำแสก	85

การรู้จักนั่งกันรักษาโรคที่เริ่มเป็นนั้น มันรักษาง่าย
ไม่ต้องเสียทรัพย์และเสียเวลาหนักมาก รวมถึง
เวลาที่เสียไปทำลังจะให้มันบ้าน ถ้าเรารู้เท่าทันนี้
ขั้นเดียว หรือผ้าชั้นร่วมผืนเดียวเรา ก็คับไฟได้ แต่ถ้าเรารู้เท่าไม่
ถึงกาง ปล่อยให้ไฟลุก窜ไปมากแล้ว ถึงแม้มันมา กางมากยังไงก็
เป็นการยากที่จะกับไฟได้ ฉันโภกฉันนั้น เพราะฉันนั้นการรู้จัก
ดูแลสุขภาพ และรู้จักใช้ยาสมุนไพรที่ใกล้ตัวเรามาก
ถ้าวิธีง่ายๆ ประหมัด และหัวถึง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิต
ประจำวันของเราทุกท่าน ทุกเพศทุกวัย ชีวิตรึจะมีความสุข
ความเจริญก้าวหน้า เมื่อเรามีสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ จิต
ใจยอมมีความสุขชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นทางการงาน ทางวาจา
และทางกิริยาท่างๆ ที่แสดงออกมา ยอมมีความสุขภาพอยู่ใน
นี้เป็นมูลฐานช่วยสร้างเสริมบุคลิกและส่งารศให้เกิดประโยชน์ เมื่อ
เรามีมีโรคภัยเบิกบาน ร่างกายย่อมสมบูรณ์ จิตใจแน่วแน่ -
มีอารมณ์ดี มีภูมิค้านทานดีต่อสิ่งทั่วไป ที่เป็นอุปสรรคในชีวิต
ประจำวัน แม้ว่าทางสังคมมีความวุ่นวาย มีคนมารบกวนก้าว
ร้าว เรา ก็มีอารมณ์ดีอยู่ให้กันได้ ลักษณะอย่างนี้เป็นบรรทัด
ฐานความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นมูลฐานนั่ง

กันโรคพยาธิ กักกันกอเหกุร้ายนานาประการไม่ให้เกิดขึ้น ขอให้ท่านผู้อ่านจงพิจารณาแล้วปฏิบัติอยู่ในทำนองคร่องธรรมชีวิตรึงจะมีความสงบสุข ท่อไปจะไก้ก่อตัวถึงค่ารายสมุนไพรให้ท่านที่สนใจไก์ทราบและนำไปใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นมีกันด้วย

ปวกหัว และ ปวกหัวข้างเตียง

ปวกหัวไม่ใช่โรคแท้เป็นอาการชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความหมายเพียงว่าผู้นั้น กระเพาะอาหาร ตับ ลำไส้ ทำงานผิดปกติ หรือผู้นั้นกินอาหารไม่ถูกก็ต้องเจ็บปวกหัวขึ้น

อาการปวกหัวอาจเกิดจากโรคร้ายแรงของสมอง ระบบประสาท โลหิตและอาจจะเป็นอาการร่วมอย่างหนึ่งที่พบกับโรคอื่น ๆ อีกมาก many ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสมองหรือศีรษะเลย

อาการปวกหัวแบ่งออกเป็น 2 ชนิด กือ 1. เกิดจากภายในกระโหลกศีรษะ 2. เกิดจากที่อื่น ๆ .

1. อาการปวกหัวเกิดจากภายในกระโหลกศีรษะนั้น อาจเกิดจากเนื้องอกในสมอง ผีในสมอง การโกรกของสมอง

หรือการอักเสบของเยื่อหุ้มสมอง

2. เกิดจากที่อื่น เช่นใช้ส้ายตามากเกินไป หรือพวง
จมูกอักเสบทำให้ป่วยหัวบวมเวตต้านหน้าของศีรษะ ถ้าป่วย
เนื่องจากใช้ส้ายตามาก นอนหลับพักผ่อนอาการป่วยหัวก็หาย
แต่ออาการป่วยหัวเกิดเนื่องจากโรคอื่นจะไม่หาย เช่น เกิดจาก
พิษของเชื้อโรค ซึ่งทำให้เกิดอาการอักเสบชนิดเฉียบพลันและ.
รุนแรง ก็ทำให้เกิดป่วยหัวได้ และมักจะมีไข้ร่วมด้วย การ
กินอาหารที่ย่อยยาก หรือคีมเหล้ามาก กาแฟมาก หรือสูบบุหรี่
มากก็ทำให้ป่วยหัวได้ คนที่เป็นโรคเส้นประสาทมักจะป่วยหัว
ทางคันหลังของคิวไซและคอ เพราะป่วยเนื่องจากการทิ้ง
เครื่องของประสาท อาการป่วยเนื่องจากความดันสูง เส้นโลหิต
แดงแข็ง หรือการพักผ่อนนอนหลับน้อยไปก็ป่วยหัวได้ กันนั้น
การรักษาจึงต้องคันหากันเหตุแล้วค่อยแก้ไขโดยรักษาโรค

ที่สำคัญท้องแก้ไข อุปนิสัยอันเป็นกันเหตุของการป่วย
และทำลายสุขภาพ และอย่าพายา呀มแก้คัวยาระงับอาการป่วย
ยาเหล่านั้นอาจระงับความเจ็บปวดให้ชั่วคราว แต่อาจทำให้
ความป่วยรุนแรงเกิดขึ้นภายหลังได้ เพราะว่ายาที่แก้ป่วยทุก
ชนิดมีพิษมีโทษอยู่ในตัว

มีกันใช้ปวคหัวงานนานนี้ รักษาทั้งหมดอธิบดีในไทย
หมดฝรั่ง แต่ยาแก้ปวคหัวทุกชนิดหาซื้อมารักษา แท่หาย
ปวคหัวช้ำครัว เมื่อหมดฤทธิ์ยาอาการปวคหัวขึ้น ยาก็ต้อง^{จะ}
เพิ่มมากขึ้น มีกันแนะนำมาหาอาหมา อาหมาได้แนะนำให้เข้า
เขารากบวนกลมไปต้มน้ำกิน เขาหารากบวนกลมไม่ได้ ด้วย
เขารากผักเขียวต้มกิน ปรากฏว่า กินแล้วได้ผลดีจังทั้งกินคิก
ก่อภัยสันวัน ทั้งแท่นน้ำมาอาการปวคหัวไม่เป็นอีก นี่แหล่ะ
นาเช่าว่า “ถางเนื้อชอบถางยา” แท่หากว่าประมาทแล้ว “ถาง
ยาอาจจะไม่ถูกกับถางเนื้อก็ได้” กันนั้น เวลาใช้ยาจึงต้องระมัดระวังให้ดีอย่าประมาท

ยาแก้ปวคศีรษะ

1. ใช้รากหาง ใจเข็ทก ห่าน ขาวง ให้เบ็น แวนบ้าง ๆ เอาปุนແກงทาที่หุนแล้วนึ่กที่ขมับจะทำให้เย็นหายปวค
2. ใช้มะนาวฝานเบ็นชิกบาง ๆ แล้วทาปุนແກงนึ่กที่
ขมับ ห้าทุกวันจนกว่าหายปวค
3. ปวคศีรษะเรื้อรัง หรือปวคหัวข้างเดียว ใช้ราก
บวนกลมหรือบวนเหลี่ยม 90 กรัม ทั้มน้ำใส่เกลือกิน

4. ปวกหัวข้างเกี่ยวใช้รากผักกาดหัว (หัวไช่เท้า) สด ก้นเอาน้ำผึ้งพิมพ์เสนเด็กน้อย และให้ผู้บ้วนอน ปวนข้างซ้าย กหยอดคน้ำยาลงจมูกข้างซ้าย ปวนข้างขวา กหยอดคน้ำยาจมูกข้างขวา ถ้าปวนหงส์สองข้างกหยอดหงส์สองข้าง หรือใช้ 'เจียะกอ' ช้อนที่ร้านขายยาจีน 2-3 นาท มากุ้นน้ำกิน

5. ปวนหัวใช้ผัดผึ้งอ่อนฝานบางๆ แข่น้ำเย็นแล้ว ทาขมับ

6. ปวนหัวข้างเกี่ยวใช้รากกะซับ จันเรือกรักบ้อเทา ข้าง ต้มน้ำใส่เกลือกิน หรือใช้กระเมืองกัวเมียคั่วคันเอาน้ำหยอดจมูกเมื่อเวลาปวนหัว

ยารักษาโรคตา

1. กา Gregga และแคกนที่ขยับกา ให้เอามะนาวฝานแล้วเอาเมล็ดในออกให้หมด แล้วบีบเอาน้ำหยอดลงในตาหลายหยด แบบหนาเอาเกี่ยวเกี่วแก้วหาย หลังจากหายແສນแล้วถางหน้าน้ำสะอาดทำวันละ 3 ครั้ง

2. กา Gregga น้ำกาไทด กาแฟ ใช้หัวกระเทียมเกี่ยวแล้วพ่นใส่ตา หรือใช้น้ำนมคนหยอดตา หรือใช้ผักบุ้ง หัวขมัน

และกันทะไคร้กัมน้ำแล้วใช้บ่นน้ำ (อบเทา) หรือใช้สารส้ม 2-5 กรัม ละลายในน้ำ 30 ซี.ซี. ใช้น้ำยอดคาหรือใช้ใบหม่อน กัมน้ำแล้วอุบหน้าก่อน พอนมกไอแล้วเอาหน้ายาท้อบันน์ล้างตา

3. กาแฟ ใช้ตันกะเมืองกอกขาวทั้งตัน ใน
ราก 1 กำมือ ต้มใส่น้ำกาลແກນพอหวานนิดหน่อย แบ่งกิน 3
เวลาหลังอาหาร ครั้งละ 1 ถ้วยกาแฟ หรือคำนันเย็น้ำแข็ง
เย็นแล้วชูบสำคัญๆ เป็นสีฟ้า เปลี่ยนบ่อยๆ ประมาณครึ่งวันจะหาย

4. ตราเจ็บ ตราแคง ใช้กันในยุค 1 ก้ามือคัมภีร์แล้ว
เอาจากทั้ง แล้วตั้มใส่เนื้อหมูแคงกิน หรือใช้ผักบุ้งแคง 1
ก้ามือทุบพอช้ำ ต้มน้ำพอสุก โรยพิมเสนลงสักหน่อยพอให้มิกลิ่น
กี้กลง เปิดฝาให้ ไ้ออกราชรัตน์จะรู้สึกสบายๆ

5. ກາເບີນຮົກສືກວງ ກາມວັງ ກາແກງ ໃຊ້ວາກຸ່ມ ໄດ້ຫອງ
ກ້າວຍໃນສັນຈົນຢັດໃນງຸ່ງນຸກ ຂາຍຫັບທົງໝາວໄວ້ 1 ດີນຈະຫາຍດໍ
ທຣີໂລໃຊ້ໃນຈອກຕໍາໃຫ້ລະເອີກ ໄສ່ພິມເສັນເລື້ອນຂອງພອກຖໍ່ເຫຼືອ
ຂອນກາ

6. ໃຊ້ໜ້ວ່ານກອງຈັກພຣະອິນທົມປາປອກ ແລ້ວນັ້ນໄຟເພຍ
ເກີຣີມທົ່ວ ແລ້ວຈຶ່ງເຫັດອົງກັນແລ້ວ ເຫັນມາຂ້າວເປີເລືອກໄວສ້ານ
ຄືນ ຈຶ່ງເຫັນມາຄັ້ນເອົານ້ຳເກີນໄວ້ຢອດກາ ແກ້ໄວກາໄດ້ກ່າວໆ ຖ.
ວິເຄີນກັບ

ยาแก้ป่วย

1. ป่วยหู หูมีหนอง ใช้ใบหูเสือจันบันเน่าหยอดหู
 2. หูตึง หูอื้อ ใช้กระเทียมสดคั้นเน่าหยอดหู
 3. ป่วยหู หูมีหนอง ใช้สูกสำโรงกาลัง 1 สูก เเจะรูสูกสำโรง แล้วเอาพิมเสนยักใส่หันก 1 นาท บีบງุ้ดแล้วเอ้าไปสูบไฟแกลงจนคำไหม้ แล้วบดเบ็นผงให้หลอดคากาแฟเบื้องหัววันละ 3-4 ครั้ง
 4. หูอื้อให้อาชัวสาร 6 ส่วน พริกไทยร้อน 4 ส่วน เกลือกะเด 3 ส่วน ทั้งสามอย่างนึ่งนำมาคั่วให้สุกก่อน แล้วบดเบ็นผงผสมกับสุราหรือน้ำร้อน กินครั้งละ 1 ข้อนโถะ หลังอาหารวันละ 3 เวลา แก้หูอื้อหูเบ็นหนอง
 5. หูตึง หูหนวก ใช้ใบมะเพื่อง ใบมะยม ใบขันนุน ทั้งสามอย่างนึ่งหันกเท่ากัน นำมาเผาไฟบดเบ็นผง ผสมกับพิมเสน แล้วใส่น้ำมันมะพร้าวหยอดหู อาการหูตึงหูหนวกจะค่อยๆ หายไป
 6. หูมีหนอง ให้อาจะกอก วิธีทำ ให้ทำความสะอาดหูก่อน โดยใช้สำลีซับหนองออก แล้วบีบนำ้มะกอกหยอดหูสัก 2-3 หยด วันละ 3 ครั้งจะหายในเวลา 4-5 วัน

ยาแก้ป้ากเปือย

1. ใช้รากหมาก รากมะพร้าว รากกาด รากไม้รากช้ำเย็นเห็นอ ช้ำเย็นไก่ กำมะถัน ยาหังเจ็คอ yogurt น้ำหนักเท่ากันพอกควร ทั้มห้ามเป็นยาสามานป้ากเปือย
2. ยาคองแก้ป้ากเปือยก่อเปือย ให้อาลูกอยอ 33 ตุก สับให้ละเอียด เด่าวัลล์เบรี่ยงสับให้ละเอียด ปริมาณเท่ากูลูกยอ ใส่เกลือพอเค็มคงทางแคดกากน้ำค้าง รับประทานแก้ป้ากเปือยก่อเปือย
3. แผ่นในป้ากใช้น้ำตาลอ้อยดุทีแผ่น ไม่นานแผ่นจะแตกและหายใน 2-3 วัน
4. ป้ากเปือยใช้กระไครน์เกงทั้มห้ามน้ำบัวป้ากบอย ๆ หรือใช้ใบเข็มบัวทั้มห้ามน้ำบัวป้าก
5. ป้ากเป็นช่าง มีเม็ดออกในป้ากในคอมีเสมหามากใช้เม็ดกมน้ำผ้าไฟฟ์คให้ละเอียด และใช้น้ำบัวเป็นกระถางผสมเข้าด้วยกันแล้วกวนชาดีก หรือใช้น้ำบัว 1 ช้อนชา ฝนกับรากมะนาวให้ข้น แล้วล้วงคอมีเด็ก 2-3 ครั้งก็หาย

ยาแก้ลิ้นเป็นผื่น

ใช้สำลีชุบน้ำน้ำนมนานาเข็กลิ้นวันละหลายครั้งจะหายดี ลิ้นเป็นผื่นคล่องใช้สังบ้าคำเผาไฟ น้ำประสาททอง หังส่องสีงัน บดกับน้ำข้าว เข็กลิ้นกัดคล่องผื่น ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ยาแก้ปูดพ่น

1. ใช้ใบอุโลกเครือ คนจนเรียกโพวท์กิม ใช้ใบสด ขี้กับเกลือแล้วยักไว้ที่พื้นปูด

2. ใช้เปลือกแตงโมทางแห้งเผาเป็นถ่าน บดเป็นผง แล้วอุดที่พื้นปูด

3. ใช้ใบผักกระเฉดนำไปทำสมกับสูรา ใช้ยอดพื้นที่ปูด หรือใช้สำลีชุบน้ำยาแล้วอุดที่พื้นปูด

4. ใช้รากผักบุ้งทำ คั้นเอาน้ำมาผสมกับน้ำสมน้ำส้มสายชูอ่อนบัวนปาก

5. ใช้กอกตุ่มของทันผักครรภ (ภาคเหนือเรียกผักเผือก คนจนเรียกอึงช่วยเกี้ย) ใช้กอกตุ่มอุดที่พื้นปูด หรือใช้ใบสด ทำกับเกลืออุดพื้นที่ปูด

6. ใช้สารสัมฤทธิ์กับเกลือ เอาอน้ำมาอ่อนแล้วบัวนปาก

7. ใช้คอกกานพสูตรชี่เหล้าหยอดอุคพื้นที่ปวน
8. ใช้การบูรยักในโพรงพื้นที่ปวน
9. ใช้ย่างทันข้อผอมเกลือใส่พื้นหรืออุคพื้นที่ปวน
10. ใช้ใบและรากจะพสูตรผอมเกลืออน
11. ใช้ใบชุมเห็ดให้ญี่ก้ากับเกลืออุคพื้นที่ปวน

ยารักษาพื้นและเหงือก

1. ใช้เปลือกชี่อย 1 กิโลกรัม ท้มเอาแต่น้ำยา ส่วน กากหั้ง สาวสัมสกุ 100 กรัม เกลือทะเล 100 กรัม นำหั้งสาม อย่างน้ำเคี้ยวให้แห้ง และใส่การบูรและเมนthonพอกควร เป็นผงเก็บไว้ให้ก็ใช้รักษาโรคพื้น โรคร่วมจะนาก และเหงือก บวม
2. ใช้รากน้อยหน่าและรากมะตะกอท้มน้ำใส่เกลือและ พิมเสน ใช้มันบัวปากบอย ๆ แก้ปากและเหงือกเป็นผล มีหนองได้คี

ยาแก้โรคลักษณะคลักษณะเบื้อง

1. ใช้ใบหนามานประสาณกายสัก 10 ช่อท้มกิน
2. สมเชี่ยวหวานหรือสมอื่น ๆ รับประทานบ่อย ๆ

หรือกินน้ำมันงาบบอย ๆ

3. กินผึ้งสดบ่อบอย ๆ หรือกินเนื้อหัมเม็ดกับทิม หรือ กินมะขามบ่อมสดวันละ 10-15 ถูก หรือใช้มะขุ่นทั้งน้ำใส่น้ำ ตาลกิน หรือใช้น้ำเชือกสดกิน

4. ใช้ถั่วเขียว 1 ถ้วยต้มกับน้ำตาลกิน ถ้าไม่มีพื้นที่ เอาผลมะคำก็ได้ 7 ผล ราดผึ้ง กะไคร้ สีสังกะสีพอควรกับ น้ำกิน

5. ใช้เปป์โกร์ดวัยหอยทองหากแห้งเผาเบ็นด้าน แล้วบด เป็นผงแตงทະที่ໄรพื้นเบ็นยาหัวมเดือก

ยาแก้เจ็บคอ

1. ใช้กันนวบวันสด ภาคเหนือเรียกผักหนอก ภาคใต้ เรียกผักแวง ใช้กันสด 60 กรัม ลงบนน้ำร้อนแล้วคนเอาเน่า อุ่น ๆ กดล้วกอย

2. ใช้สิริเสียงกุมไว้ให้ลึ้น หรือใช้ใบหนุมานประisan กายสด ๆ เกี้ยวแล้วกินช้า ๆ

3. ใช้ใบพื้宰ถ่ายโจรสด เกี้ยวกินช้า ๆ ให้չ่าเรือ ที่ล้ำคอ

4. ใช้หอย้างวงซังหงกัน ในราก ก้มน้ำกสิว กอนบ่อยๆ
5. ใช้เกลือบ่นครึ่งช้อนชาละลายในน้ำครึ่งแก้วกสิว กอ
6. ใช้รากบัวกลด หรือบัวเหลียน แข่น้ำในภาชนะ
กระเบื้อง และวินเจ้าน้ำกิน
7. ใช้ใบสดกันพื้นที่เยียว ทำให้ลักษณะเยียกผอมน้ำท้าล
แคงอกนหรือกิน
8. เจ็บคอท่องท่อนชิดอักเสบ ใช้กันโคงเทง (Jin
เวียกเทงหลังเช่า) ใช้กันสดกันเจ้าน้ำผอมเหล้าชูบดำลีอิมไว้
ข้างแก้ม ก่อຍ ๆ กดินน้ำยาผ่านบริเวณที่เจ็บคอที่ลະน้อย วัน
ตะหนาดายกรุ้ง
9. ท่องท่อนชิดอักเสบใช้กันหยาให้ ใบคำให้ลักษณะ
ใส่เหล้าขาวนิคหน่อยแล้วนึนเป็นเม็ด เม็ดเท่าผลลำไย ห่อสำลี
แล้วอมไว้ ก่อຍ ๆ กดินน้ำยาลงลำคอ
10. หลอดคลอมอักเสบเรื้อรัง ใช้โคงเทงกันแห้ง 500
กรัม บดเป็นผงท่าเป็นน้ำเชื่อมแบ่งกิน 10 วัน กินครั้งละ 50
มิลลิกรัม วันละ 3 เวลาหลังอาหาร ระยะ 10 วันเป็นหนึ่งรอบ
พักสามวันแล้วจึงทำใหม่กินอีก ทำอย่างนี้ประมาณสามรอบโกร
จะหาย

ไข้หวัด

โรคนี้ไก่ ๆ ก็รู้จัก อาการเริ่มเป็น พอมีความรู้สึกผิดปกติธรรมชาติ รู้สึกมีอาการป่วยเมื่อยเล็กน้อย (ด้ารู้จักรักษาทรงนี้ง่ายนิดเดียว) ต่อมายานมีอาการไอและขาบ่อย ๆ มีน้ำมูกใส ๆ ด้วยอาการไข้และป่วยเมื่อยลอกลง น้ำมูกจะมีสีขาวซุ่น และกล้ายกเป็นสีเหลืองก่อนจะแห้ง ถ้ามีโรคแทรกเข้าจะทำให้หลอดลมอักเสบ

วิธีขับงักและปฏิบัติ

1. ระวังคินพ้าอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น ความเย็น ความร้อน ความชื้น การทำงานมาก การอุดนอนและเห็นด้วยอยู่อ่อนเพลีย ซึ่งเป็นช่องทางให้เชื้อไวรัสเข้าในร่างกายขณะที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันทำงานน้อย
2. ระวังอย่าเข้าใกล้ผู้ที่เป็นโรคหวัด เพราะเชื้อก็ติดต่อง่าย
3. คนที่เป็นหวัดบ่อย ๆ เวลาอาบน้ำทุกครั้งให้อาบน้ำรากที่เท้าก่อน แล้วรากที่ขา แล้วเอาน้ำใส่มีomaลูบที่หน้าอก หลังจากนั้นจะอาบยังไงก็ตามสะดวก แล้วจะไม่เป็นหวัดหรือถ้ารู้สึกเป็นหวัดก็ไม่รุนแรง ส่วนคนที่กำลังเป็นหวัดนั้น

ค้องระวังอย่าไอหรือจามได้หน้าผู้ที่อยู่ใกล้

4. เมื่อรู้สึกว่ามีอาการไม่สมบายนั่นก็รินกินยาแล้วพักผ่อนด้วยอาการมากให้อาเจ้าแท้ๆ ชั่วคราว ให้ผู้บุญอนห่มผ้าให้อุ่นอย่าให้หัวใจสั่น กินอาหารอ่อนๆ และค้มน้ำให้มากๆ ส่วนกัวยาที่ใช้รักษา มีดังนี้

ยารักษาโรคหวัด

1. เป็นหวัดมีไข้ปอดหัวทัวร้อน ไอ เจ็บคอ หรือบางคนมีอาการท้องเสียให้อาเจ้าพำเพย์โลร์กันสก 1 กำมีอ ต้มน้ำใส่น้ำกาลแตงกิ้น หรือใช้แห้งบดเป็นผงผสมน้ำสุก กินครั้งละ 1-2 กรัม วันละ 3 เวลา หรือทำเบื้องยาเม็ดกิน

2. ไข้หวัดทัวร้อนใช้ก้นไก่เทง ภาคเหนือเรียกว่าบ่าทำตอก อ่างทองเรียกหมู้าโง่เกง คุน Jin เรียกเทงลึงเช่า หรือเทียงพ้าเช่า ใช้ก้นสด 60-90 กรัม ท้มน้ำใส่น้ำกาลแตงกิ้นวันละ 3 เวลา

3. ไข้หวัดปอดศรีษะใช้รากหมู้าขักมอญ ทางภาคกลางเรียกขักบอนกัวผู้ ทางภาคตะวันออกเรียกหมู้าขัก หรืออิกิมแตง ภาคเหนือเรียกหมู้าขักน้อยในบัน จีนเรียกบัวยเน็ก เช่า ใช้ราก 60 กรัมท้มน้ำกิน

4. ใช้หัวคักคักน้ำมันอาหารตามน้ำมูกในต ใช้หัวหอมทุบให้แตกต้มน้ำให้เดือด ยกลงแล้วเอาผ้าคุณกัวทำเป็นกระโจนสุกเอาไอน้ำ แท่ท้องหลับตาแล้วจะไม่แสบตา ถึงจะแสบก็ไม่น่ากลัว

5. ถ้าเป็นหวัดมีอาการไม่มาก ใช้มะนาว 2 ถูกบีบ เอาน้ำใส่เกลือ 1 ช้อนชา ใส่น้ำผึ้งหรือน้ำกากอนให้เข้ากันแล้วจิบบ่อยๆ

6. ใช้กระเทียมสดเคี้ยวกินสัก 4-6 กลีบ หรือใช้ใบหนามานประสถานกายน้ำสดเคี้ยวกิน

7. เป็นหวัดทั่วอันไปแห้งๆ ใช้กันพังพวยสด 60-90 กรัมก้มน้ำกิน

8. ใช้หัวคัก (มีใช้ไอซิม) ใช้กันหมอน้อยสด 1 ก้อน มือก้มน้ำกินวนละ 3 เวลา ก่อนอาหาร

9. ใช้หัวคักลงกอนมีอาการเจ็บคอ ใช้พิริกไทย 8 กรัม พสมน้ำเค็อก 500 ซี.ซี. ใช้มนบันปากกลัวกอย

๑๙

เป็นอาการแสดงให้เห็นว่าจะเป็นโรค มักเกิดขึ้นร่วม

กับโรคอื่นเช่น หวัด เจ็บคอ ทอนซินอักเสบ ไข้หวัดใหญ่
เยื่อหุ้มอักเสบ วัณโรค และโรคอื่นๆ อีกหลายอย่าง

วิธีบ่องกันรากยา

ให้หาสาเหตุและแก้ไข ถ้าอาการนั้นเกิดจากในคอให้
ใช้ประคบรากวัวร้อนบริเวณคอวันละ 2 ครั้ง ถ้าไอเกิดจาก
ทรวงอกให้อบความร้อนในบริเวณอกและคอวันละ 2 ครั้ง ถ้า
ไอมากควรใช้ยาอื่นช่วย ถ้าไอน้อยให้ใช้น้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง
และเกลือจิบกิน ถ้าไอเกิน 7 วันควรปรึกษาแพทย์

ยาแก้ไอ

1. ใช้ใบพุดดกทัมน้ำให้เกือกแล้วใส่เกลือกิน
2. ใช้หัวกระเทียมตำให้ละเอียดผสมน้ำมะนาวและ
เกลือ กวนพอหรือจิบกิน
3. ใช้เง่าชิง หอม เกลือ ตำผสมน้ำผึ้งกิน
4. ใช้น้ำส้มมะขามเปียกผสมน้ำผึ้งกิน
5. ไอมีเสนหะมาก หอบ หีบ ใช้กันโงเงงสด 60
กรัมกัมน้ำใส่น้ำกาลແກງกิน
6. ใช้ข้าวแล้วทบผ่านบางๆ บีบมะนาวเกิมน้ำกาลแล้ว

ยำไว้เกี้ยวกளືນ

7. ใช้ก้นบีกแมลงสาม (กรุงเทพฯ เรียกกันปู หรือ ก้ามปูหลุด) ใช้ก้นสัก 60 กรัมก้มกับปอกหมูกินหลังอาหาร วันละ 3 เวลา

8. ไอหอบใช้ก้อกบวนกตามหรือบวนเหตุย่มทั้น้ำใส่น้ำผึ้งกิน

9. ใช้รากมะเขือขื่นทำกับเกลือแล้วอ่อน

10. ใช้ผัดมะเขือเท่าอายุคนบ่วยทำกันเย็นน้ำผัดสมน้ำเข้ากันแล้วจิบกิน

11. ไอเรื้อรังใช้ชิงสักทำกันเย็นน้ำสัก 30 ซี.ซี. ใส่น้ำผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำสุก gonให้เข้ากันแล้วจิบกิน

ยาแก้หอบหืด

1. ใช้ใบหนุมานประสถานกายทั้นน้ำกิน หรือใช้ใบเขียวสดเกี้ยวกளືนขณะหอบหืดเป็นมาก

2. ใช้ใบหญ้าขี้กใบบ້ອນ ที่ประจวนก็รีขันธ์เรียกกลางทราย ทั้นน้ำกิน

3. ใช้เบล็อกสม์โอลเพาเป็นด่านบคเป็นผงตะถายน้ำผึ้งกิน

4. ใช้ใบหรือดอกลำโพงหันเป็นฝอยหากแห้งมวนเป็นบุหรี่สูบ
5. ใช้ใบกระเพราแครงผสมปูนกินหมากขี้ทากามกัวและศีรษะ
6. ใช้ใบกล้วยทานห่อผิวไม้ไผ่ทึมกิน
7. ใช้ใบหญ้าງวงช้าง ปูนแครง ใบหนาด และใบกระเพราแครงผสมกับน้ำกิน
8. ใช้วรากดอกคำใต้แซ่น้ำแล้วกิน
9. ใช้ถั่วกบนาไม่รู้โรย 10 กอก ต้มน้ำใส่เหล้าnid หน่อยกินวันละ 3 ครั้ง

สะอึก

สะอึกเป็นอาการที่หายใจเข้าอย่างทันทีทันใด เนื่องจาก การหลอกทัวของกระบังลม สาเหตุเกิดจากการรบกวนในกระเพาะอาหาร มักจะเกิดขึ้นภายหลังอาหารหนักหรือกินเร็วเกินไปทำให้เกี่ยวไม่สะเอียด มีการรบกวนเส้นประสาทที่ไปควบคุมกระบังลม

การรบกวนน้ำอาจมาจากการติดตัวกับถุงน้ำดี กระเพาะอาหาร ท่อนชิล พื้น หรือเกิดจากการผ่าท้อง หรือประ-

สาขแก้ตัว สมบัติ นีองอก

การรักษา

ถ้าเป็นสะอิกธรรมชาติให้กินน้ำยาไว้ให้นานหรือคืนน้ำให้นาน หรือแห้งหน้าเพ่งคุเพคนยาการก็จะหายไปเอง ถ้าเป็นสะอิกติดท่อ กันหลาย ๆ ชั่วโมง หลายวัน หลายเดือน มันก่อรามานทนไม่ให้หายให้อาเว่นไฟ หรือไฟแรง จึงเรียกเลี้ยงเที่ยวสัก 30 กรมทุบให้แตกใส่น้ำประมาณ 300 ซี.ซี. ทั้งเหลือ 200 ซี.ซี. กินยาแล้วไม่เก็บทิ้งหาย รักษาหายไปหลายคันแล้ว ท่านที่ต้องการขอได้ทั่วถือมงคล

ยาแก้เลือดกำเดา

1. ใช้เบลือกกลัวยหอมเผาเป็นด่าน แล้วบดเป็นผงใส่หลอดกาแฟเบ้าเข้ารูจมูก

2. ใช้รากว่านไฟ 1 กิโลมิตรกิน หรือใช้ใบสนหางสิงห์ (เชียงใหม่เรียก จันทร์ กรุงเทพฯ เรียก สนเทศ หรือ สนแพร คนจีนเรียก เน็กแปะ) ใช้ใบแห้ง และกอกหันทิมแห้ง หนักเท่ากันบดเป็นผงเบ้าเข้ารูจมูก ถ้ามีอาการมากใช้ยาทึกครั้งไม่ได้ผล ก็เอาหันกู้ไปมาคำนับเอาน้ำมนต์ให้ร้อน

ພອຊຸ່ນ ຈ ກິນ

ຢາແກ້ແພດໃນຂມງອັກເສບ

ໃຫ້ຊຸກເກືອຍ ແລະ ພັກເຂົ້າວົກມັນນ້າກິນ

ຢາແກ້ໄຂນ້ຕເຮືອຮັງ

ໃຫ້ພຶດຖັ້ນກັນສົກຄົນເຫັນ້າແລ້ວໃສ່ພິມເຫັນໃນຄຫນ່ອຍ ທຍອກ
ຮູ້ມຸກວັນລະຫລາຍກຽງ ພຣັນກັບໃຫ້ກັນສົກ 30 ກຣັມກັມນ້າກິນ
ດ້າໃຫນສົມນີນ້າມຸກໃຫລ ໄທເອົາຫານອ້ອຍທີ່ສະອາຄແໜ້ງ ຈ ເພາໄຟ (ກາກ
ອ້ອຍທີ່ເກີຍວົກນ້າແລ້ວກາກແໜ້ງເອົາໄວ) ບົກເບື້ນຜົງໄທລະເວີຍຕ
ຜສນກັບພິມເຫັນ ໃຫ້ກົດລັງເບົ່າຂໍາມູກວັນລະຫລາຍກຽງ ຍານ້າໃຫ້
ໄກເຈັບພະທີມນ້າມຸກໃຫລ ດ້າມີຫນອງຫວົອເນື້ອງອົກໄນ້ໄກັດ

ຢາແກ້ໄຂນ້ຕແລຣົຄຕືກວງຂມງ

1. ໃຫ້ເອົາໃນຫາກ ໃບກລັວຍນໍ້າ ຖັນສອງຍ່າງນີ້ຫັນ
ເປັນຝອຍກາກໃຫແໜ້ງ ກໍານະດັນເຫດີອນໃນຄຫນ່ອຍ ຮາກກະເທີຍນ
ພອບຮ່ານມາລັບ ທັນໜ້າມຄສນໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວໃຫ້ໃບກລັວຍນໍ້າມວນສູນ
2. ໃຫ້ນະຖຸນອ່ອນແໜ້ງ ພຣິກໄທຍ່ອນ ກະຮາຍດໍາ ໃນ
ອັງການເຫດີອງ ຍາທັງສອຍຍ່າງນ້າຫັກເທິກັນບົກເບື້ນຜົງຜສນນ້າຜົ່ງ

ນັ້ນເປັນເນັດທ່ານເນັດມະລະກອບ ກິນທັງອາຫາເຊົ້າ ເຢັ້ນ ວັນທະ 2
ເວລາ ກຽງຕະ 15-30 ເນັດ

3. ໃຫ້ເຂົາຄຸກຈັນທີ່ ມາຫີ້ງກໍ ກາຣນູຣ ຍາກຳ ພຍ່າງຕະ
2 ທຳລົງ ພຣິກໄທຍ 8 ທຳລົງ ຍາກັ້ງໜົມຄົນບົດເປັນພັງລະດາຍນ້າ
ມະກຸກນັ້ນເປັນເນັດທ່ານເນັດພຸຖາ ກິນວັນຕະ 2 ກຽງໆຕະ 2 ເນັດ
ກ່ອນອາຫາເຊົ້າ ເຢັ້ນ

4. ໄຊນັ້ນນຳມຸກເປັນສີເໜືອງ ໄຊຫຼັງກະທ່າຍຈານ
(ກົນຈົນເຮັກໂອ່ວເກີຍອື້ນເຊື້ອແນ້າ) ຂີ້ແລ້ວຍັກໄວ້ຮູ້ມຸກ

5. ໄຊນັ້ນນຳມຸກໄທລົມກົດນີ້ເໝັນ ໄຊເຕັນວັນກອມໄກຕີ
ທີ່ຮາກສັກ 1 ຕອກ ເພາເປັນດ່ານແລ້ວບົດເປັນພັງແຕ້ວັພສມເຫັນກິນ
ແລະໃຊ້ຜົງເນົາເຂົ້າຮູ້ມຸກ

6. ວິຄສີກວງຈຸນຸກໃຊ້ພິມເສັນຍ່າງຄືກ່າທີ່ຫັວວິຄສີກວງຫວີໂອ
ໃຊ້ສ້າງສັນຕະຖຸພສມກັບນໍາມັນໜຸ້ມ ແລ້ວໃຊ້ຜ້າທ່ອຍັກໄສ່ຮູ້ມຸກ

7. ວິຄສີກວງຈຸນຸກໃຫ້ເຂົາໃບອັກກີທວາ ໃບນັວກ ເປົ້ອກ
ກັ້ງສາມຍ່າງນີ້ກາກແທ້ງ ພສມພິມເສັນກັບກາຣນູຣເຕັກນ້ອຍ ແລ້ວ
ໃຊ້ໃນທອງອ່ອນນວນສຸນ

8. ຈຸນຸກນີ້ ຮ່ານອງ ກັນໃຊ້ເນັດກຸ້ໄຈ່ ສຸນໄຟ ແຕ້ວມຄວນ
ຮ່ານອງຈະອອກນາ

9. เลือกกำเต้าไห碌ไม่หดุก ใช้กระเทียมตำให้ละเอียก
แล้วพออกที่อุ้งเท้าเลือกจะหดุกเอง

ความคื้นໂຄທີ

กັນເຫດຖືກຈາກຫລາຍອ່າງ ບາງຮາຍຫາເຫດແນ່ນອນໄນ້
ໄດ້ ບາງຮາຍກິນອາຫາຮາມາກເກີນໄປ ກວ່າເກ්ຮ່ງກັບຊີວິກນາກເກີນໄປ
ກິນເຫດສູນບຸ້ຫົມາກຕັບໄກເຮືອຮັງ

ອາກາຣທີພົມເຫັນໄດ້ວ້າຍນອກຄີ່ອຜູ້ທີ່ເປັນວ້າຍດັງກຳນ ລ່າງ
ກາຍອ້ວນຜົວສີຄຳແກງລັກຂະດະກໍາຢໍາລໍາສັນ ບາງຮາຍນີ້ອາກາຣປວກ
ກີ່ຽະເວີຍນ້ຳຫຼູ້ອົກຕາມ ນອນໄນ້ຄ່ອຍທັບໜ້າໃຈເກີນແຮງຜົກ
ປຽກຄີ (ດັ່ງນີ້ອາກາຣອ່າງນີ້ໃຊ້ຢ້າຮັກໝາໄນ້ໄກັຜົດ ໃຫ້ເຫຼາພຣິກໄທຍ
ວ່ອນ 7 ເມັກ ຂ້າວສາຣ໌ເໜີຍ 7 ເມັກ ມໍາຫຼັກ 4 ເມັກ
ທົ່ວທີ່ນໍາຫຼັກ 2 ຕໍາລົງ ກີ້ອ້ອນໍາຫຼັກ 2 ຖໍາລົງ ຢ່າທັງໝ້າອ່າງນັກ
ໃຫ້ລະເອີຍກ ແນ່ງອອກເປັນສາມສ່ວນ ກ່ອນນອນໃຫ້ເອາຫນີ້ສ່ວນ
ຜົມກັນໃໝ່ໄກ່ຂ່າວ ແລ້ວພອກທີ່ຜ່າເທົ້າ (ອັ້ງເທົ້າ) ໃຊ້ຜັກພັກໄວ້
ໃຫ້ແນ່ນກລອດຄົນ ຜູ້ໜ້າພຍກໄວ້ທີ່ເທົ້າໜ້າຜູ້ໜູ້ຜົງພອກທີ່ເທົ້າຂ່າວ
ດັ່ງອາກາຣເບື້ນໄນ້ມາກ ພອກກຽງ ເຖິວຄວາມ ດັ່ນກົດລົງ ເປັນປຽກຄີ
ດັ່ງເປັນນາກໃຫ້ກຳຕົກຕ່ອກນັ້ນໜໍາກຸງຄຸງຢາ ແກ່ກັ້ອງກິນຢ້າຮັກໝາໄທ

จึงจะหายขาด) และอาการอื่น ๆ เช่นหน้าแดงท้องผูก หายใจไม่สกวน ถ้ามีอาการมากจะทำให้เส้นโลหิตในหัวใจคัน หรืออุดตัน (ถ้ามีอาการที่ว่านี้ควรรับประทานทันทีนมสดหรือ หัวหอมสด และกระเทียมสดจะช่วยลดไขมันในเส้นโลหิตของ ท่านและความคันให้เป็นปกติได้ด้วย ใช้หัวหอมสกรับประทาน มีอยู่ 5-6 瓣 ถ้าใช้หัวหอมหัวเล็กมีอยู่ 4-5 หัว กินพร้อม กับรับประทานอาหารทุกเช้าเย็น ประมาณสัก 10 วัน หรือ ใช้คอกอกกำเฝอย 1 หัวมีอ หอกเก็บรักษาไว้ประมาณ 10 หอก ໄส น้ำสองแก้วทั้มน้ำกิน) ข้อควรระวังผู้ที่เป็นความคันโลหิตสูง ต้องดูอาหารหวานและมันจัดและเกินให้น้อยที่สุด ควรกินผลไม้และผักสดให้มาก หางานอดิเรกที่ถูกใจประสาททำ ซึ่งเป็น ที่ยอมรับลักษณะ ทำสีงที่มีประโยชน์และเกิดอารมณ์เพลิดเพลิน ควรทำงานสังคมและการเยี่ยมเพื่อนฝูงที่ไม่จำเป็น พยายามทำ ใจให้สังบ

ยาสำคัญความคันโลหิตสูง

1. ใช้ยอดเกสรช้าวโพดแห้ง 1 ก้านมีอ เปลือกแหง โนแห้ง 1 ก้านมีอ เปลือกกลัวยหอมแห้ง 2-3 ผัด นำมาก้ม น้ำกินท่างน้ำชา

2. ใช้กันคืนในปูรุ่งเป็นอาหารกิน
3. ใช้กอกคำฝอย 1 หยิบมือชงน้ำร้อนก้มท่างน้ำชา
4. ใช้ก้าฝากมะม่วงหงับตันตันเป็นท่อนสัน ๆ ทางแห้ง
แล้วคั่วให้เหลืองซังน้ำร้อน หรือผสมใบชาซองกินท่างน้ำชา แก้
ความคันและเบาหวาน
5. เจากวยกับน้ำตาลແກงกินบ่อย ๆ ก็ช่วยลดความคัน
6. ล่ายาให้แห้งทั้งกินท่างน้ำก็ถูกความคันได้
7. ใช้รากระย่องหนัก 10 นาท บดเป็นผงให้ละเอียด
ใช้ครั้งละ 1-2 ช้อนกาแฟกับน้ำอุ่นกินอย่างกินมากมีฤทธิ์แรง

ยาแก้ความคัน แก้ปีคหัว มีนัง แก้วตัด แก้ล้มเหลวในการะเหา

ให้อาบินคีนใช่ 20 ใบ ในโหนะพา 10 ใบ เมน
ทอด 10 เกร็ก พิมเสน 20 เกร็ก น้ำมะกรุกครึ่งลูก น้ำมันนา
ครึ่งลูก วิธีทำทำให้เข้ากันรับประทานก่อนอาหาร
ผู้ที่มีความคัน โดยทิ้งสูงน้ำกวนระวังอารมณ์ทึงเครียด
และหงส์มัน จะทำให้เส้นโดยทิ้งฝอยในสมองແแทกหรืออุ้กคันเป็น
เหตุอันพาท กันนั้นผู้ที่อยู่ใกล้เหตุการณ์จะเป็นท้องรุ้งกปญ

พยาบาลโดยกวนจะไม่เป็นอัมพาตภายใน มีกันนี้ ผู้บ่วยบางรายเมื่อหัดนั่งหรือเหตุอื่นจะมีอาการกัดพ่น มือกำเน้น หน้าแดง วิธีพยาบาลให้อาสาูกับน้ำยาร้อนน้ำวาน้ำท่าเทวีออกพ่น แล้วรับไปอาบน้ำ (จีนเรียกเจิกเปีะเซี่ย) 1 กำมือ ทันหอมทั้งราก (ทั้งใบ) 1 กำมือ รวมกันทำคันเข้าน้ำผสานกับเหล้าหนึ่งถ้วยก้าแฟ ทั้งให้เกือกสัก 2-3 นาทีแล้วยกลง พอน้ำยาอุ่นๆ ก็กรอกปากเข้าไปให้หมดทิ้งไว้ ผู้ที่ไม่เคยกินเหล้าแบ่งกินหลายครั้งได้ หรือใช้ในหนูนาประสาณกาย 10-15 ช่อทำผสานกับสุราขาว 3 ช้อนโต๊ะ น้ำอุ่น 2 ช้อนโต๊ะ ระยะต่อไปอาการดีขึ้นให้ลัดลง เอาใบหนูนาประสาณกาย 7-10 ช่อทำเหลืองกิน แบ่งกินวันละ 2 หลังอาหารเข้าและก่อนนอน จะช่วยประสาณเส้นโลหิตผอยให้ต่อ กันและเส้นโลหิตที่กั้งอยู่ในสมองออกโดยไม่ต้องผ่าตัด แต่ถ้าผู้บ่วยเป็นลมหมัดติด แบ่งมืออ้าปาก คาดสน เสียงกรนกัง หายใจเบา บื้สภาวะ ไม่รู้สึกตัวให้ใช้ยาข่านนี้ หยิ่งเชียน 3 สด หุ้จ้อ 2 สด (เอายาทั้งสองอย่างนี้ร่วนขายยาจีนมีขาย) แล้วเอามาท้มน้ำกรอกปากถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นให้รับไปหาแพทย์ทันที

โรคเหน็บชา

กันเหทุเกิດจากอาการขาดอาหาร โดยเนพะพວกวิตามิน บี ๑ วิตามิน บี ๑ มีอยู่ในเปลือกนอกรของเมล็ดข้าวและถั่วมาก กว่าอาหารอื่น

อาการโรคเหน็บชา คนที่เป็นโรคเหน็บชา มักจะมี อาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย โดยเนพะกล้ามเนื้อมักจะลับลง ความเคลื่อนไหวไม่สะดวกและผิดปกติ บางส่วนอาจเป็นอันพากและอาจมีอาการบวมเพราะมัน้าก็มากก็ได้ ด้วยอาการมากอาจจะทำให้เส้นประสาทที่ควบคุมหัวใจเตื่อง มีผลเกิดหัวใจวาย

ยารักษารอยเหน็บชา

1. ให้อาร์บัปถายข้าวสาร (รำข้าว) ๒ ลิตร เมล็ดงา กำ ๑ ลิตร กระเทียม ๑ กำมือ หันให้บ้าง ๆ ย่างหั่นหมักนึ่งไว้สักบุคเป็นผงผสมกับน้ำผึ้ง หรือน้ำตาลเคี้ยวกินอย่างช่นม
2. เ hnебชาหั่นหัว ให้อาสักชี ๑ นาท ใบมะกา ๒ นาท แก่นแสมหั่น ๒ หนักสีงดะ ๓ นาท แห้วหมู ๔ นาท แก่นชี้เหล็ก ๕ นาท แก่นไม้สัก ๖ นาท แก่นขันนุน ๗ นาท

ผึ้กคุณ 8 บาท สะค้าน 9 บาท รากชลุค 10 บาท มะกูม
อ่อน 11 บาท มะคำไก่ 12 บาท ยานั่นทั่มน้ำกินวิเศษนัก

ยาแก้โรคเริม ภูษัวด์ ขยันตันหมา

1. ใช้เป็ดอุกมังคุดแห้งบดเป็นผงผสมน้ำปูนแดง (ปูนกินกับหมาก) ทา
2. ใช้ใบแมงรักหงัน ราก ทำไส่น้ำตามແゲงกันเอาน้ำทา
3. ใช้คินตอนเพาไฟให้ไหม้แล้วต่อกับว่านหางกระเช้าให้เห็นiyaphutongกับเหล้าขาวทา
4. ใช้ใบสนุ่นสดกำกับสุราทา
5. ใช้ใบเสลดกพังพอนกำกับพิมเสนและเหล้าขาว แล้วพอกที่แผล
6. ใช้ก้นผักกะสั้ง ขมันอ้อย ปลายช้าวสาร ทำให้ละเอียดละลายน้ำชาแล้วทาตรงที่เป็นเริม
7. ใช้ใบวางจีคเทาพอกที่เป็นเริม
8. ใช้ใบว่านตอนพิษหรือจักรนารายณ์ จันเรยกะปีะกังบึง ตำก้นเอาน้ำผงผสมพิมเสนทา

9. ใช้ใบพุกงานสดคำพอก หรือใช้ใบแห้ง บดเป็นผง
ผสมกับเหล้าข้าวสาลี

ยาแก้แพ่ผลถั่วย ใช้ปูนแหงที่กินกับหมากหากาไฟแห้ง
นำมาบดกับสารสัมฤทธิ์ให้เข้ากันสนิท และวิริยาแตะพอกที่แพด
สามวันหาย

ยาแก้แพ่ผลเรือรัง ให้อาหารล่าของค้า (มะเขือบัว)
ฝานเป็นชิ้นๆ กากแห้ง กองน้ำมันเครื่อง ใช้ห้าแยกเรือรัง เป็น
ยาฟื้นฟูโรคภัยทางเด็ก แก่เด็ก

ผู้ธรรมชาติ และ ผู้บัว

อาการเรื้อรังกันมีนเม็ดเล็ก ๆ หรือก้อนแข็ง ๆ และโกร
ขึ้นอย่างรวดเร็ว มีหัวหนองเกิดขึ้นตรงกลาง ถ้าขึ้นที่ผิวนังมี
เนื้ออ่อนนุ่ม กจะไม่ค่อยเจ็บ ถ้าเกิดที่อวัยวะสำคัญ จะมีอาการเจ็บ
มากและรุนแรง โดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมจากสันนมูกามถึง
มุมปากทั้งสองข้าง เชื้อโรคจะกระจายเข้าไปสู่เส้นโลหิตในหัว
หรือเข้าสู่สูตรานส่วนล่างของสมอง ทำให้เกิดโลหิตบีบพิษอย่าง
แรง หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

การใช้ยาสมุนไพรรักษา

1. ผู้อักเสบทุกชนิด เมื่อยังไม่แทรก ให้ใช้หัวหอม และเบี้ยงหนี่ ผสมกับน้ำผึ้งแล้วทำให้เข้ากัน ย่างไฟให้อุ่นแล้ว พอกที่แผล
2. ใช้ว่านดอนพิษหรือจักรนารายณ์ จันเรียกแปะกัง นึง ใช้ใบสดตำใส่น้ำตามแต่ชอบเป็นยาดอนพิษฝี แก้ปวย อักเสบทุกชนิด แก้พิษงู แมลงบ่อง และสกปรกพิษชุม กัดท่อข่าย แก้ฟกซ้ำบวม เป็นยาคุกคุดอนพิษได้ดี
3. ผู้เกิดขันที่เก้านมทุกชนิด และมีอาการอักเสบ รวมทั้งมะเร็ง ให้อาชัวพักทองนึ่งไฟให้เป็นถ่าน บดเนื้อผง ใช้ครั้งละ 5-6 กรัมผสมเหล้าขาวกิน แล้วให้ผู้บุญวันนอนห่ม ผ้าให้มีเหงื่อออออก ส่วนภายนอกใช้ผงผสมน้ำมันนังทาทาที่แผล (ข้าวใหม่ๆ ไม่ก่ออย่างผิด ถ้าเก่าหลายๆ นี้ได้ผลก็มาก)
4. ผู้หัวชาดและอักเสบมีอาการถึงเพ้อ เพราะพิษกำเริง เอา้น้ำตาลทรายประมาณ 150 กรัมผสมน้ำกิน แล้วเอา กอกอกเก็บช่วย (เบญจมาศคอกขาว) 1 กgabe มือ ตำใส่น้ำตาลแตง แตงพอก หรือใช้ใบพุกคลำกำพอก

5. ผือกเสบกินไม่ได้นอนไม่หลับให้อาการเทียนโกรน คำพสมกับน้ำมันงาพอกแพดให้หනา เป็นยาถอนพิษและรังนบ ความเจ็บปวดให้ดี ถ้าไม่มีกระเทียมโกรนใช้กระเทียมธรรมชาติได้

6. ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแยและสารเกิดขึ้นที่เท้านมหรือ อวัยวะส่วนอื่น ๆ หรือปวดตามข้อหรือมีทะคริว ให้อาหารห่อน หรือก้นหอนทำให้ลํะเอียคัวให้ร้อน ใช้ผ้าห่อแล้วประคบไว้ที่ ปวดถ้าเย็นก็คัวให้ร้อนใหม่แล้วทำอย่างเดิม เมื่อหายแล้วห้าม กินเนื้อเท่ากlostอกชีวิต

7. ยาพอกผื่กต่าง ๆ ให้อาชัวร์สูนไฟ 1 ในบอะ เพ็ก 1 ช้อนอ้อย 1 ในสะเตา 1 ในฝรั่ง 1 คำพอก

8. ยาทาแก้ผื่พิษผื่กษา ให้อาสุกกระเจ้าคัวให้เกรี้ยน พิมเสนบกให้ลํะเอียค คีหมู 2 กี เอาแก่น้ำคีมากวนกับยาแล้ว ทา hairy ค

9. ใช้รากลำโพงฝาน กับน้ำปูนแครง ทาแก้พิษผื่กับพิษ ร้อน แก้ปั๊กบวมอักเสบ

ยาแก้กลากเกตต้อน

1. ใช้ใบทองพันชั่งและรากคำทาที่แพด

2. ใช้หัวกระเทียมสดบีบเอาน้ำทาก็แผล
3. ใช้ใบเนื้อย่น่าทำทาก็แผล
4. ใช้ใบแมงลักษณ์คำกันเอาน้ำทาก็แผล
5. ใช้ก้นน้านมราชสีห์เล็กคำพอกก็แผล
6. ใช้ยางมะตะบะกอทาก็แผล
7. ใช้ใบชุมเห็ดเทศคำกันเอาผอมน้ำมะนาวทาก็แผล

ยาแก้ผิวหนังยื่นคัน

1. ใช้ใบมะขามกัมน้ำอาน
2. ใช้ใบคำลึงคำแล้วทากามกัว หรือใช้ใบไพลคำแล้วถูกกี้ด้า
3. ใช้ใบชุมเห็ด กระเทียม ขมิ้น ผอมกันคำแล้วทา
4. ใช้เปลือกมังคุดคำใส่แผลหรือผนกับน้ำปูนใส่ทา
5. ใช้กระเทียมกับกำมะถันคำผอมน้ำมะพร้าวทา
6. ใช้เหง้าขมิ้นชัน หัวไพล สารส้ม คำผอมน้ำมะนาวทา
7. ใช้ใบฝรั่งกัมน้ำอาน
8. ใช้ใบเหงือกปลาหมอดกัมน้ำอาน หรือคำเอาน้ำทาก

9. ใช้ใบหนาคกัม្រាន់រាល
 10. ใช้កន្លឹមតាមទេរកកុងក្រាន់រាល

ยาแก้พิษ

1. ใช้ใบเสлокพังพอน 1 กgabe มือประมาณ 20-30 ใบ กำลําลายเหล้าขาวกัน เอาน้ำยา กินแล้ว เอากากพอกบนริเวณที่ถูกงูกัด ถ้าไกรถูกงูกัด ก็ต้องย่าลีมเอาผ้ารักเส้น โดยทิ้งเห็นอ่อนแผลนั้นให้แน่น
 2. ใช้ใบเดากันแห้ง 5-6 ใบ กำกัน เอาน้ำแล้วผสานน้ำขาวข้าว กิน แล้วใช้อีก 4-5 ใบ กำพอกที่แผล
 3. ใช้ผักบุ้งสด กำกัน เอาน้ำประมาณครึ่งถ้วยผสานเหล้าขาว กิน เอากากพอกที่แผล
 4. ใช้ใบว่านวง ทำผสานน้ำมะนาวหรือเหล้า กิน
 5. ใช้ว่านวง ห่อฟันกับน้ำ กินและทา

ยาแก้พิษสัตว์กัดต่อย

1. ใช้ย่างมะละกอทากับบริเวณแผล
 2. ใช้วุ่นแกงทากับผลดูกอกกั้กท่อyle="color: red;">ย
 3. ใช้รากไม้เท้ายายม่อมฟันกับน้ำทาตรงที่ดูกอกกั้กท่อyle="color: red;">ย

4. ใช้ใบพ้าทะลายโรงค่าไส่เหล้าทากแก้พิษทะขานกั้ก
5. ใช้ใบผักบุ้งทะเลค้ำพาออกตอนพิษแมงกะพรุนไฟ
6. ใช้ผักบุ้งสดค้ำไส่เกลือนิกหน่ออยพาอกรแพด
7. ใช้ผักกาดส้มค้ำพาอกรตอนพิษผึ้งท่ออย
8. ใช้ผักกาดคน้ำสกครึ่งบวบเรือนที่ถูกผึ้งท่ออย
9. ใช้วรากเจกมูลเพลิงแคงแข็จเหล้าทาก
10. ใช้สารสัมค้ำเป็นผงไส่แพลที่ถูกแมลงบ่องท่ออย

แยกสด สมานแพด

1. ใช้ใบสาบเสือค้ำหรือชี้แล้วพาอกรแพตสด (หญ้าชนิดนี้เรียกชื่อต่างกันคันนี้ ภาคกลางเรียกว่า หมาลง ผักกราก หญ้าเสือหมอบ หญ้าคงรัง ภาคใต้เรียก หญ้าเมืองวาย ใช้ปูกุย ตะพัง พาพัง ภาคเหนือเรียก นุ่งกระต่าย หญ้าลิน เมือง หญ้าเหม็น ภาคอีสานเรียก กันฝรังเศส เบนฤๅษามาค)

2. ใช้ใบหนุนานปะรานกายค้ำพาอกรแพดห้ามเดือด
3. ใช้ใบฤทธิ์ผสมแล้วชี้ทากแพด
4. ใช้ผักที่แคคลูกบัวออกแล้วค้ำเอาน้ำไส่แพตสด
5. ใช้ใบแทงโนนสดค้ำพาอกรแพตสด

ยาแก้พิษบาดทะยัก

ใช้หันงควายกว้าง 12 คุณ 13 น้ำ ทางแห้งเผาไฟ
เป็นชี้เก็บกินให้ละเอียดเก็บใส่ขวดไว้ เวลาท้องการใช้ 1 ช้อน
ความสมเหล้าขาว 1 กิงกนให้เข้ากันให้ผู้บ้วงกิน เมื่อย่างถึง
ท้องผู้บ้วงสักพักมือเท้าจะค่อยๆ อ่อนลง แล้วจะถ่ายพิษบาด
ทะยักออกเป็นสีดำ รอสัก 30 นาทีให้ผู้บ้วงกินยาอีกรึ่งเดียว
รอเวลาตามกำหนด ถ้าผู้บ้วงหายแล้วให้หยุดยา ถ้ายังไม่หาย
ก็ให้ยาเป็นระยะๆ กว่าผู้บ้วงหายจะหายเป็นปกติ ยาทำรับนี้ได้
น้ำยารอคงจากความทรมานแล้วหลายคน

ถูกหนาม เชื้น เบ็ค เสียน ลูกบีน ผึ้งเข้าไปในเนื้อ
ไม่ถ่องผ่าออก ให้อาบพุงคอ 1 กำมือ งำค่า 1 กำมือ กำ
รวมกันแล้วพอกที่แผล (ทำรับนี้โดยอาจารย์บัญญา ตรัชัย
โทร. 5956884)

ถูกเสียน หนาม ทำผึ้งเข้าไปในเนื้อ มียาแก้กังนี้

1. ให้อาหารหัวหอมแดง 5 หัว ชี้ให้ยังไม่จุกไฟ 1 หัว
แม่มือ เกลือทะเบ 3 เม็ด ทำรวมกันพอกที่แผล จะคุกเอา
เสียนหนามออกภายใน 10 นาที

2. ใช้เมล็ดพื้กทองคำให้แหลกแล้วขยำกับน้ำบีกแพด

ถูกเสียนหนามตะปู่ “คำ ทึม ยอด” จะคุกพิษให้หายจากเจ็บปวดได้โดยเร็ว ส่วนยางของพักทองก็ได้คั้นแล้วกันและสูงสวัสดิ์

3. ตะปู่คำใช้หัวชิงทำผสมสุราพอกแผล

ลมพิษใช้ใบพลูชี้พ้อซ้าแล้วเอ้าผ้าขาวบางห่อแล้วชุบเหล้าขาวทาถุงริเวณที่ก้นบ່อย ๆ หรือใช้ใบไฟตองชี้แล้วทาหรือใช้ใบถางจีกกำแล้วทา

น้ำร้อนลวก ไฟลวก

1. ใช้ไข่ไก่คั่วผสมกับน้ำมันมะพร้าวทา
2. ใช้น้ำมันงาผสมชี้แพะทา
3. ใช้กินปลวกเผาไฟผสมน้ำมันมะพร้าวทา
4. ใช้ใบบัวบกทำผสมน้ำมันน้ำปูทา
5. ใช้ใบพื้นที่ลายโรงบกเป็นผงผสมน้ำมันพีชาทา
6. ใช้ใบมะขามอ่อนทำผสมกับกะไคร่ร่าน้ำทา
7. ใช้น้ำปูนใสผสมน้ำมันมะพร้าวทา
8. ใช้ว่านหางจระเข้ชี้กับน้ำเอากากพอก
9. ใช้ยาสีพื้นชนิดครีมทา

โรคแพ้ในกระเพาะอาหารและลำไส้

โรคนี้เริ่มเป็นจะมีอาการเบื่ออาหาร ท้องอืด ท้องเพื่อ
อาการนี้จะเป็นเรื่อยๆ สาเหตุส่วนมากมาจากการบุคคลที่ทำงาน
มากมีภาระหนักตึงเครียด รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา ความ
วิตกกังวล นอนไม่หลับ ทิ้งสูบมากๆ เหล่านี้เป็นผลผลกระทบ
กระเทือนถึงอวัยวะในช่องท้อง เป็นผลทำให้ในกระเพาะอาหาร
มีกรดมากทำให้เกิดอาการแสบร้อน เเรอบ่อยๆ หรืออาเจียน
หลงจากรับประทานอาหารแล้ว และอาจเจ็บบริเวณกระเพาะ
อาหาร อาการอย่างนี้ถ้าไม่รีบแก้ไขรักษาอาจจะเป็นแพลใน
กระเพาะอาหาร การรักษาโรคที่ได้ถ่วงมานี้ให้อา ข้าว
เหนียวคำหนึ่งถวายครัวให้สุก พริกไทยครึ่งถวาย คึปลีครึ่งถวาย
เกลือหนึ่งกำมือ ยาหั้งหมกนับคึบเป็นผงผสมกันเข้าเก็บเอาไว้
ใช้ครั้งละหนึ่งช้อนโถะซงกับน้ำสุก รับประทานก่อนอาหาร
วันละสามเวลา ให้ก็คต่อ กันเป็นประจำทุกๆ วันอย่าให้ขาด
จนกว่าโรคจะหายไปเด็ดขาด

ถ้ากระเพาะอาหารเป็นแพลงนี้มีอาการปวดในบริเวณ
ลิ้นปี๊และกระเพาะอาหาร มักจะมีอาการปวดหลังรับประทาน
อาหารประมาณ 1 ชั่วโมง และกล่องคืนเป็นประจำ ถ้ามียา-

การปวกก่อนอาหารหรือเวลาท้องว่าง เป็นอาการของแพลงค์น้ำใส่เล็กส่วนก้น ถ้าแพลงค์น้ำกว้างออกไปจนทำลายทดลองโดยทิ้งให้โลหิตออก และอาเจียนเป็นโดยทิ้งหรืออุจจาระเป็นสีดำ จะทำให้โลหิตขาว ถ้าได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้องและนานเกินไปอาจทำให้กระเพาะหดตัว ทำให้เยื่อบุกระเพาะอักเสบ และกล้ายเป็นแพลงค์น้ำเร็วๆ ได้

การรักษาแพลงค์น้ำใส่ สวนสมุนไพรวัสดุโภคภัย (สวนพุทธธรรม) ให้ทดลองใช้ช้อนน้ำคั่วให้ลักษณะอุดมด้วยน้ำสุกอบประทาน เวลาเช้าท้องว่างและก่อนนอน ประมาณว่าผู้บุญได้รับประทานยาแล้วทดลอง 24 ชั่วโมง ไม่มีอาการเจ็บปဨก เมื่อเวลาเช้าถ่ายอุจจาระเป็นปกติไม่เป็นสีดำ แต่ถ้าเป็นแพลงค์น้ำเร็วจะมีอาการปวกแบบ เมื่อได้ถ่ายอุจจาระแล้วอาการก็ชี้น ใช้เวลาไม่เกินໂรมก์หายขาด ไม่เหมือนยาแผนบ้านบันทึ้ง รักษาเป็นเวลา หลายสัปดาห์ หรือท้อง ใช้การผ่าตัดถัดกันซึ่งระหว่างหลังเลียงการรับประทานเกร็องค์มีประเกท ก้าเพน้ำชา น้ำอัดลม สุราของกอย และอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนนัก ประมาณ 2-3 สัปดาห์ มีฉะนั้นแล้วอาจทำให้โรคกำเริบจะมีอาการเจ็บแน่นมากขึ้นมาอีก (หมายเหตุ.- ช้อนคั่มน้ำมีฤทธิ์พิเศษ

ทำให้แผ่นในกระเพาะ อุจจาระ และลำไส้หาย สนใจอย่าง รวดเร็ว
และยังใช้รักษาโรคอื่น ๆ อีกมาก ท่านที่ต้องการขอติบก่อ
ปริกษากับ พระเม้ง วัดอุโมงค์)

ปูคหบดีเหลืองจะเป็นบิด

ให้อาบในฝรั่งประมาณ 10 ใบทุบให้แหลก ใส่น้ำหนึ่ง
ถ้วยแก้ว ท้มใส่เกลือเล็กน้อยให้เค็อมีสักครู่แล้วยกลง พ่ออุ่น ๆ
คั่มสักกริ่งแก้ว ครั้งเดียวหาย

ห้องเดินห้องร่วง

1.. ใช้ใบผั่งรังอ่อน ๆ เคี้ยวแล้วกัดน้ำ (ทางเชียง-
ใหม่เรียกมะกัววย)

2. ใช้เปลือกหันแคหรือแคบ้านก้มน้ำกิน

3. ใช้เปลือกถุงมังคุดทั้มน้ำให้เค็อมีสัก 10 นาที คั่ม
ครั้งละหนึ่งถ้วยแก้วทุกครั้งที่ถ่ายห้อง หรือใช้เปลือกฝนกับ
น้ำกิน

4. ใช้รากหรือเหง้ากระชาย (เชียงใหม่เรียก หัวละ
แอนหรือกะแอน) ตำผสมน้ำปูนใสกิน

5. ใช้ผงมะกูมอ่อน (ภาคเหนือเรียก มะบีน ภาคเหนือ
แม่ย่องสอนเรียก มะบีส่า) วิธีใช้ ฝานผงอ่อนเป็นชั้นบาง ๆ
ซึ่งกับน้ำเกือกจัด ๆ คั่มครั้งละ 1 แก้ว วันละ 3-4 ครั้ง
6. ใช้กัลวยน้ำวัวกินหันหากแกอกิน
7. ใช้ใบสีเดียดเทศก้มน้ำกิน
8. ใช้ผักเสียง (เชียงใหม่เรียก ส้มเสียงผี) ใช้หง
กันก้มน้ำกิน

ท้องบูก

1. ชุมเหต๊กเทศ (ภาคกลางเรียก ชุมเห็น ชุมเหต๊กใหญ่
ภาคเหนือเรียก ชี้คาด หมากะลิ้ง เล็บมีนหลวง ลับมีนหลวง
กระเหลี่ยงแม่ย่องสอนเรียก ตะสิพอ) ใบสด 8-10 ใบ ย่างไฟ
พอโกรังดินหอมก้มน้ำกินครั้งละ 1 แก้ว ถ้าเป็นดอกสดใช้ 1
-2 ช่อ ลวกน้ำร้อนแล้วจมน้ำพริกกิน
2. มะขามเบี้ยก (ภาคใต้เรียก ขาน ภาคอีสานเรียก
กะลุบ กาลูจนบุรีเรียก ม่วงโคลัง) ใช้เนื้อในผักประมาณ 2
ก้อนโกรเท่าน้ำหัวแม่มือ (ถ้าธาตุหนักใช้ 3 ก้อน) กลูกับ
เกลือกินกับน้ำอุ่นก่อนอาหารเข้า

3. ผักคุน (หรือผักราชพฤกษ์) ซื้อที่ร้านขายยาสามสัก 1 กิโล สับให้สันๆ ใส่น้ำแก้วครึ่ง ใช้ไฟอ่อนเคี่ยวเหลือหนึ่งแก้วกินตอนเข้าท้องว่างให้หมด

4. ใช้ใบขี้เหล็ก (ภาคใต้เรียก ยะห่อ ภาคพยัնเรียก ขี้เหล็กบ้าน) ทั้งใบใส่เกลือเอา้น้ำคั่มหรือแกงกินก็ได้

5. ใช้กันผักเบี้กแกงก้มใส่น้ำตาลแกงกินเป็นอาหารนายสำหรับคนแก่

6. น้ำผึ้ง 2 ช้อนโถะ เกลือครึ่งช้อนชา น้ำ 1 แก้ว กินตอนเข้าท้องว่าง

7. น้ำสับปะรดสด 1 ถ้วย เกลือพอควร กินตอนเข้าท้องว่าง

นอกจากนี้ควรกินอาหารช่วยย่อย เช่น คำลึง หรือผักคำลึง (เชียงใหม่เรียก ผักแกน) มะละกอ (ภาคเหนือเรียก มะกัวยเทพ) ใช้เนื้อสุกกิน และพวงผัก

ห้องเสีย บิดชนิดไม่มีไข้

1. ใช้รากหญ้าไก่ใบประมาณ 20 กิโล หั่นเป็นท่อนสันๆ ทั้งกับน้ำ 3 แก้วให้เหลือ 2 แก้ว คั่มครั้งๆ กระชังแก้ว คั่มช้าๆ อยู่ๆ

2. เอาหัวหรือแง่งขมันชันตำให้ลักษณะเป็นรูปเจือ
น้ำสุกเท่าทั่ว กินครั้งละ 2 ช้อนโถะ วันละ 3-4 เวลา (ใส่
เกลือสักนิดหน่อยก็ค)

ชาตุพิการอาหารไม่มีอยู่ ปวดท้อง

- ให้อาบในสะเดาสด 1 กำมือใส่น้ำ 2 แก้วก้มเหลือ
1 แก้ว ใส่น้ำตาลทรายແ肯กินครั้งละ 1 แก้ว
- ใช้กระเทียมสัก 5 กลิ่นสับให้ละเอียด กินกับน้ำ
หลังอาหารทุกมื้อ
- ใช้ไข่แก่ฝานบางๆ 5 แผ่น ช่า 3 แผ่น คึบลิ
1 เม็ด ใช้น้ำสองแก้วก้มให้เหลือแก้วครึ่ง กินครั้งละครึ่งแก้ว
ทุกมื้อหลังอาหาร

ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเพ้อ ถูกเสียด

- กานพดู (กานเห็นอเรียกรัตน์ ทองกรัตน์) ใช้
กอกกุม 4-6 กอก ทุบให้ช้ำแล้วซงกับน้ำร้อนคึ่มครั้งละครึ่ง
แก้ว เกีกอ่อนใช้กอกแห้ง 1 กอกซงใส่ในกระถินน้ำร้อนที่ใช้
สำหรับซงนมให้เกีกอ่อนกิน จะบ่องกันท้องขึ้น ท้องเพ้อใน

ເຖິງອ່ອນໄກຕີ

2. (สำหรับเด็ก) ใช้มหาทิงค์ ซื้อชากร้านขายยา นำมาฝนกับน้ำทากันน้ำท้องแล้วเย็นบีบไว้ จะหายลงแล้วท้องหายอีก หรือใช้ปุ๋นแดงชี้แล้วกดลูกน้ำมะนาว แล้วทาท้องเด็กสักครู่จะหายลง

3. ใช้การบูนก้อนขนาดเม็ด ถ่วงเชือว ใส่ในถ้วยยาจีน เท่าน้ำร้อนจักๆ 2 ช้อนโต๊肯ให้ละลาย (ถ้าละลายไม่หมดก็ไม่เป็นไร) ให้เย็นแล้วก้มกรังเคียวให้ทันท

4. ใช้ชิงแก่เพื่อความทุบให้แตกกัม្ពោតได้น้ำตาลกົມ្ភະ

5. ใช้ใบกระเพรา 1 ก้านมือ ใส่น้ำ 2 แก้ว ใช้ไฟอ่อนก้มพอเกือบแล้วยกลงบีดไว้ (อย่าใช้ไฟแรงเพรอะสูรจะระเหยไปหมด) คั่วทั่งน้ำชา

6. ใช้เงื่องหรือหัวข้อ ช่าในญี่ ช่านหลวง ทุบให้แตก
ก้มน้ำกิน

7. ใช้ใบชะพฤติ · (ภาคเหนือเรียกพลุนก ภาคใต้เรียก
นมวะ ภาคอีสานเรียกผักก้อเล็ก) เอาใบ 1 ก้านมือก้มน้ำกิน

8. ใช้เงว้าหรือรากของกระชาย กำลังเอียกผสานน้ำ

บุญใส่กิน

9. ใช้เตาและใบหรือเม็กคิปี 1 ฝามือกัมนำกิน
10. ใช้มะกุ่มกัมนำกิน หรือกินเนื้อสกสับปะรดก็ได้

ยาแก้ท้อซึ้งร่วง อหิราท'

ใช้ผัวไม้ไผ่อະไรก์ได้ ชูกณาหนึ่งกำมือ น้ำมานำใส่น้ำ
แก้วครึ่งก้นใส่เกลือกิน 1 แก้วก็หาย ยาที่กีรักษาโรคให้หายดี
นั้นขันอยู่กับคนไข้ต้องรู้จักช่วยคนเอง มีฉะนั้นแล้วอาการจะ^{จะ}
หาย ๆ เป็น ๆ ก่อตัวคือคนไข้ต้องรู้จักกันเหตุที่ทำให้เกิดโรค
แล้วระวังพยาภานหลีกเลี่ยงเสีย สาเหตุที่ทำให้อาหารไม่ย่อยนั้น
ส่วนมากก็จะเกิดจากกินอาหารไม่เป็นเวลา กินพร้าวเพรือ กิน
อาหารที่ย่อยยาก ๆ ฯลฯ จึงทำให้การย่อยอาหารช้ากว่าธรรมชาติ
หรือย่อยอาหารไม่หมด เนื่องผลทำให้เกิดการบูดเน่าขึ้นภายใน
ระบบทางเดินอาหาร ทำให้เรอແนื้ออีกด้วยกับริเวณกระเพาะ
อาหาร ห้องอีกด้วยพองและอีกด้วย บางที่อยู่จะระร่วง ปวด
หัวและสมยองมีนั่ง ถังน้ำกินอาหารก้อนจะระมัดระวังให้กี

ปวยท้อซึ้งเพราจะอาหารเป็นพิษ

ใช้กันสะระแหน่ (ภาคเหนือเรียกหอมคุ่น หรือหอม

เกือน ภาคใต้เรียก มักงะ หรือสะแ่น' ภาคกลางเรียกสะระ-แทน' ส่วนจีนเรียก บ้อห่อ) ลักษณะ 1 ก้ามือ กำผอมกับเหล้าขาวคันเขาน้ำกินครึ่งถ้วย 1 ถ้วยชา

ยาแก้น้ำและอาการ

1. ใช้รากมะละกอ 1 ก้ามือ เปลือกหอยแครง 7 ฝา เพาไฟ ไส้น้ำ 3 แก้วท้มเหลืองหนึ่งแก้วครึ่งกิน 3 เวลา ก่อนอาหาร
2. ใช้รากยอ 1 ก้ามือ รากมะละกอตัวผู้ 1 ก้ามือ รากมะเพื่อง 1 ก้ามือ ข้าวเจ้าเปลือก 1 ก้ามือ ทั้มน้ำกินค้างชา รักษาหายไปหล่ายคนแล้ว
3. ใช้สารสัมเท่าหัวแม่มือใส่ลงไปในแทงกوا แล้วนึ่งให้สุกคันเขาน้ำกิน แก้น้ำค่างๆ ได้ดี
4. ใช้หอยเผาให้ใน หังกัน ใน ราก 1 ก้ามือ คัวให้เหลืองไส้น้ำสามแก้ว ทั้มเหลือแก้วครึ่ง กินครึ่งครึ่งแก้วก่อนอาหารทุกวัน แก้น้ำในໄກ น้ำคุกน้ำคั้น น้ำกระเพาะบี้สภาวะ
5. บี้สภาวะชักเบ็นน้ำ ใช้หอยเผาหัวหมูแมว (ทางกรุงเทพฯ เรียก พยับเมฆ) ยา 1 พุก 1 ก้ามือหักให้สัน ไส้น้ำ

3 ชาก เกลือ 3 เม็ดใหญ่ ก้มให้เหลือ 2 ชาก พยาภานกิน。
ให้ทันควรภายในหนึ่งวัน ถ่ายบ๊สสาวะน้ำจะเบ่งออกมาเอง

อาการนี้ในกระเพาะบ๊สสาวะ มีอาการคือเวลาถ่าย
บ๊สสาวะจะมีอาการขึ้นทึ้งที่ยังถ่ายบ๊สสาวะไม่หมด ถ้าเป็นนี้
ไทยมีอาการปวดดึงบริเวณหัวเหน่าและโคนขา ถ้าอาการยัง
ไม่นัก ใช้น้ำมะเดื่อง 40 ซ.ซ. ใส่สารสัมนิคหน่ออยกิน หรือ
เอาใบกุฉ่ายทำก้นເօນ้ำสัก 30 ซ.ซ. ผสมเหล้าและสารสัมนิค
หน่ออยกิน ถ้าเป็นนี้ในถุงน้ำดีจะมีอาการหน้าๆ ร้อนๆ ที่
ท้องช้ำขวนน มีอาการปวดเป็นระยะ หรือปวดแบบอย่าง
ฉบับพลันถูกตามไปถึงไหหลอด จะมีอาการเป็นกີช່ານชาๆ
หายๆ ที่เห็นໄດ້ซักคือช้ำท้องขวนมีความเจ็บปวด การ
รักษาให้อา ແປวยຈຳຈັດ กົມຈືອເຈົ້າ (ກົມຫວັກິນ) อย่าง
ละเอียดก่อตัวกัน (ไปซื้อที่ร้านขายยาจีน 1 ห่อ กົມกิน
1 วัน กົກກ່ອກນ 7 วัน)

โรคศีดวงทวาร

- การรักษาโรคศีดวงทวาร ให้ผัดกินเนื้อเจ้าเป็นก้อยรู้จัก
สมุนไพรและบื้องกันเสียก่อนจะได้ผลดี มีเช่นนี้แล้วอาจ

ทำให้หายช้ำหรือไม่ได้ผลด้วย สาเหตุที่ทำให้เป็นริดสิกรวนนี้ ส่วนมากเกิดจากอุจจาระผูกเบ่งเมื่อเวลาถ่ายอุจจาระ โดยเฉพาะถุงแพลงก์ถัมคลุกโกรกนั้น เช่นในระยะครรภ์แก่มคลุกจะกดลงบนลำไส้ใหญ่ หรือการเบ่งในการถอดคลุก จะทำให้โลหิตกำกั้งภายในทวารหนักอุดตัน หรือทำให้การไหลเวียนของโลหิตช้าลง จึงทำให้เรื้อรานิด “กึกซุกคุ่ง” เข้าไปอยู่ในโลหิตทำให้เกิดริดสิกรวน

นอกจากนี้การ ไหลเวียน ของโลหิต ในลำไส้ใหญ่ตอน ใกล้ทวารหนัก มีทางเดินท่อ กับ การ ไหลเวียน ของ โลหิต ใน กับ ฉะนั้นถ้ามี โลหิต กั้ง ใน กับ หรือ ผู้ ที่ เป็น โรค ปอด เวลา ไอ มี เสมห ลง ไป ใน ลำ ไส้ เป็น โอกาส ทำ ให้ เกิด ริดสิกร ให้ได้ เพราะ เป็น เชื้อ ชนิด เกี้ยวกัน ริดสิกร เกิดขึ้น และ แม้ ก็ จะ ไม่ หาย เอง ถ้า มี การ ทอก โลหิต กบ อยู่ ๆ อาจ จะ ทำ ให้ เป็น โรค โลหิต ทาง หรือ เป็น นาน ไม่ ไกร กษชา อาจ ทำ ให้ เกิด เป็น เนื้อร้าย ซึ่ง เป็น กัน เทก เกิด มะเร็ง ทวาร หนัก ได้

อาการ เริ่ม เป็น ส่วน มาก จะ คัน รอบ ๆ ทวาร หนัก ค้าน ใน และ ค้าน นอก หรือ เจ็บ ที่ ทวาร หนัก เวลา ถ่าย อุจจาระ บาง ราย อาจ มี ก้อน เนื้อ เล็ก ยื่น ออก มา อาจ มี โลหิต ซึม ออก มา อาสา

บ้องกันและปฎิบัติ มีกันนี้

1. ระวังอาหารที่ทำให้อุจาระผูก
2. ระวังไข้แพนบีชบันทึกอุทธรังษี เช่นคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารเรื้อรังรักษาด้วยยาตัวพวก “อสูมินีเยม ไซครอคไซค์เยต” โดยรู้ว่าไม่ถึงการฟอกมากเกินควร ทำให้อุจาระแข็ง เวลาดื่มน้ำอุจาระต้องใช้กำลังเบ่งบ่อย ๆ ทำให้ลำไส้ใหญ่อักเสบหรือเส้นโลหิตคำอุดตัน ซึ่งเป็นทันเหตุทำให้เกิดริดสีดวงได้ง่าย
3. พยายามหลีกเลี่ยงการเบ่งกำลังที่ไม่จำเป็น
4. ถ้ามีหัวริดสีดวงยืนอยู่มาให้อาเจลือ 1 ช้อนชา น้ำ 1 ถ้วยแก้ว ผสมกันแล้วล้างให้สะอาดแล้วเช็ดแห้งทายามีกันนี้

ยาที่ใช้รักษาริดสีดวง

1. ใช้หัวหรือเหง้ากระเทกร กะหรือเตาลิงโถ ภาคใต้เรียกกระโปรงทอง ภาคอีสานเรียกผักห่านอ้อย จังหวัดชัยนาท เรียก เดาเงาะ ให้น้ำเอาหัวมาทำให้ละเอียดแล้วผสมน้ำปูนแกง ทางที่หัวริดสีดวงไม่ว่าจะเป็นริดสีดวงชนิดใดก็สามารถน้ำจะผ่อแห้งไว้ปะยาง

2. ใช้ใบอัคคีทวารย่างไฟให้อ่อนแล้วชี้หันไว้ที่หัว
ริคสีกวง

3. ใช้ใบหญ้าเสือจัน และใบเตลอกพังพอนทำไส่สารสับ
เล็กน้อย ทา

4. ยา กินแก้ริคสีกวงภาย ใน ให้อาบในและครอบของ
ทันอัคคีทวารนึงให้สุก เม็ดคงค่านึงสุก กระชายคำ ทึ่สาม
อย่างหากแคบให้แห้งแล้วบดเป็นผง วิธีทำ อัคคีทวาร 4 ส่วน
เม็ดคงคำ 2 ส่วน กระชายคำ 2 ส่วน

5. ใช้ผักบุ้งสด 1 กิโลกรัม น้ำหนึ่งลิตร ต้มให้เหลว
กรองเอาน้ำเอากาหง ใส่น้ำตาลทรายขาว 120 กรัม เกี้ยว
ให้เหนียวเหมือนน้ำเชื่อม กินครั้งละ 40 กรัม วันละ 2 เวลา
เช้า เย็น ถ้าไม่หายทำกินต่อ

6. พริกไทย หومบ้ม และนาผึ้งและน้ำตาลทราย
เอพริกไทย 2 กรัม หومบ้ม 4 กรัม และนาผึ้งหรือน้ำตาล
ผสมกันกินครั้งละ 1 ช้อนชา

7. มะพร้าวอ่อนเบิดปากกึ่งไฟจนร้อนจัด แล้วใส่สาร
หญูหนัก 5 บาท (ซื้อที่ร้านขายยา) แล้วนึ่งแบบนั้งถ่ายร้อนໄอ

8. นวนขม ใบเจ็กหมูฝาน ใบพาโนน และหัว

เปราะเดือน ทั้ง 4 น้ำท่ากันเน้น้ำผอมกับกะบิปริมาณเท่ากัน
เกี่ยวกัน

9. ใช้ว่านเพชรสังฆาต ทำกับมะขามเบี้ยกหรือบีน
เป็นเม็ดเท่าเม็ดพุทรา กินครั้งละ 3 เม็ดวันละ 3 เวลา ก่อน
อาหาร ก่อนทำการใช้ถุงมือสวมเพราะมียางจะทำให้กัน ถ้าจะ
ให้ง่ายก็ใช้ครั้งละ 2 ข้อไม่ให้มีทางหันเป็นข้อเด็ก ๆ พอกลืนได้
แก่ท้องห่อ ด้วยมะขามเบี้ยก หรือใบผักที่ก้มสูก แล้วเพื่อบีบองกัน
กันคอ หรือจะใช้ดักใส่กล้วยสุกได้

ใบร้อน กระหายน้ำ

1. ใช้ใบบัวบกกับน้ำชาวดำกับกิน
2. ใช้ใบมะกา ไฟรวมกันก้มน้ำกิน
3. ใช้กันผักกาดน้ำก้มใส่น้ำทาลกรวบกิน และเป็นยา
แก้เจ็บคอ
4. ใช้กันพังพวยสก 60-120 กรัมทำกันเน้น้ำผอม
น้ำผึ้งก้มพออุ่นกิน
5. ใช้ใบมะขามก้มน้ำอาบและรีบีรัง

ยาแก้ค้อพอกหรือคอโถ

ให้อาในงะชาม 3 ก้ามีอทัมแล้วกรองเอาแท่น้ำเกี่ยว
ชนงวคันดอย่าให้ไหม แล้วใส่ยาค้าเท่าๆ กันผสมกัวยกันแล้ว
พอกที่คอบวนหรือคอโถ

ส่วนยาคินให้อาข้าวเย็นเนื้อ ข้าวเย็นให้ วางแผนกุ้ง
น้อย วางแผนในญี่ ขันทองพยาบาท หัวหนองทรายาค ก้ามะ-
ตันเหลืองหนักถึงละ 10 บาท ทัมกินวันละ 3 เวลาหลังอาหาร

โรคเบาหวาน

โรคนี้เริ่มเป็นผู้บ่วยส่วนมากไม่รู้ตัว เพราะไม่มีอาการ
เจ็บปีคหรือไม่สบายอย่างใดเลย เพียงแต่มีบลสภาวะมากขึ้น
ทุกวันและบลสภาวะบ่อยๆ เมื่อโรคเป็นมากขึ้นจึงจะพอรู้สึกมี
อาการอ่อนเพลียง่ายและเหงื่อออกมาก การกินการก็มากกว่า
ธรรมชาตแทร่ำงกายกลับผอมลง ยิ่งนานวันก็ยิ่งหมดกำลัง บาง
รายอาจมีอาการซึมไม่ได้ติดและอาจมีอาการกัน โดยเฉพาะ
รอบๆ อวัยวะเพศ มีอาการเท้าเย็นเพราะโลหิตหมุนเวียนไม่
สะดวก

นึ่งกันและรักษา

ถ้าสังสัยว่าจะเป็น โรคเบาหวานควรรีบตรวจ โลหิตและ

บั๊สสาวะ ถ้าเบาหวานที่เริ่มเป็นควรจัดอาหารที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เช่นลดออกอาหารประเภทเบี้ยงແلاءของหวาน น้ำอัดลมทุกชนิด ทุเรียน หน่อไม้คอง กล้วย ข้าวหมาก น้ำมะพร้าว อ่อน ผลิตาย แตงโม น้อยหน่า ขันุน ข้าวโพด ควรรับประทานผักเขียวและพวงผลไม้ที่มีไว้กามิน ซึ่ง เช่นน้ำมะนาว

ส่วนยาสมุนไพรรักษา โรคเบาหวาน นั้นมีมาก ชนิดสุก แล้วแต่หาได้สะดวก ตัวยา มี กังน้ำ

1. ถ้าอาการยังไม่มากให้อาบในรูงจีกชนิดอกส้ม่วง 30-50 ใบกำกั้น เอาน้ำผึ้งน้ำชาช้ำช้ำให้ไก่ตัก 1 แก้ว 加 วัวแฟ กินก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง กินทิคก่อ กัน 2-3 วัน ๆ ละ 1 กรังก์ ประจำวัน

2. ใช้ใบอินทนิน น้ำแห้ง ครัวให้กรอบ ประมาณ 8-9 ใบกับน้ำ กิน ก่างน้ำชา ให้ทิคก่อ กัน สัก 1 สัปดาห์ แล้วไปตรวจ น้ำตาล ในเตือก

3. ใช้เก้น กัน ชี้เหล็ก ก้มน้ำ 3 ส่วน เหติ 1 ส่วน กิน วันละ 3 เวลา

4. มะระ ขึ้นกใช้เป็นอาหาร ตัว ก้มน้ำ พริก หรือ กิน ผัด แกง กิน

5. ใช้แก่นตะเกกับพ芳ช้าวท้มน้ำคึ่มต่างน้ำชา
ยาแก้ผู้ที่เป็นเบาหวานอาการมาก

1. ให้ใช้รำข้าวอ่อน ๆ สัก 5–6 ลิตรใส่หม้อให้ญี่เกินน้ำให้มากทั้งเคียวไฟให้นาน ๆ แล้วกรองเอาน้ำเก็บไว้ เอาใบเทยและใบสักหรืออินทนิลน้ำ น้ำหนักเท่ากันเอาไปผึ้งแกะแล้วย่างให้กรอบเก็บไว้ เวลาใช้ให้หยอดเอา 1 ก้อนเมื่อไหญี่เกิน กับน้ำรำข้าวที่กล่าวตนันกินต่างน้ำชา

2. กำแพงเจ็ชั้นหนัก 2 บาท แซ่บ้า 2 บาท มะแวงเกรือ 2 บาท โนกขาว 2 บาท เดาหมาดแกง 2 บาท ชาเย็นไทย 2 บาท รากคำเจียกหนัก 3 บาท รากคนทาหนัก 3 บาท ตัวยาหัง 8 อย่างนี้ซื้อที่ร้านขายเครื่องยาแล้วนำมาทับกินต่างน้ำชา

3. ว่านເອີ້ນແລດືອງແຫ້ງ 1 ส่วน พັກະຄາຍໂຈຣແຫ້ງ 1 ส่วน กระชาคำແຫ້ງครึ่งส่วน เอาทัวยาหังสามอย่างบดเป็นผงผสมน้ำผึ้งนนเป็นเม็ด ญົມດเท่ากับมະລະກອກກິນกรັງລະ 10–15 เม็ด วันละ 3 เวลา

4. ใช้กันเหงือกปลาหม้อ ทองพันชั้ง ข้าวเย็นหังสองไม้สัก พญา rakคำ หัวร้อยธู เชือกเขานัง อย่างละ 2 บาท

ใส่หม้อคินก้มกินต่างน้ำประมาณ 10 วัน

ข้อระวังใช้ยาลดน้ำ kald ในเลือด ให้สั้นเกตุอาการถ้าน้ำ kald ลดลงฉับพลันหรือลดลงท้ามาก จะทำให้กัวเย็น หน้ามืด ใจหวา เป็นลม ให้รีบรับประทานน้ำ kald หรือข้นหวานทันที และหยุดกินยา

โรคไต

โรคไก่นั้นมีอยู่หลายชนิดและเกิดขึ้นไก่ตาย ประการอาการสำคัญคือบวม เพราะไก่มีหน้าที่ขับน้ำ เมื่อไก่พิการขับน้ำออกมากได้น้อยก็จะกังอยู่ในร่างกาย ก็จะแสดงออกมาด้วยการบวม ส่วนจะบวมมากหรือน้อยนั้นแล้วแต่ชนิดของโรคและระยะเวลาที่เป็นโรค โรคไก่อกเสบรุนแรงมักบวมแท้ไม่มากให้คุ้มที่หนังกา หน้าคอมะลำตัว ส่วนโรคไกเรือรังมักจะบวมส่วนร่าง เช่น ห้อง ขา เท้า และอัณฑะ เพราะร่างกายเสียไข่ขาวนานทำให้ไข่ขาวในเลือกดัก น้ำในเส้นเลือกซึมออกมายื่นให้ผิวนั้งโดยเฉพาะท่อนร่างของร่างกาย แทรกมีโรคอื่นที่มีไข่ขาวในเลือกดัก เช่น โรคกับ โรคโคลนิกทาง โรคขาดอาหารถ้าเป็นหอยิงมักบวมเกี้ยวกับโรคประจำเดือน ซึ่งควบคุมโดยฮอร์โมนเพศ

โรคไทด์เกิดขึ้น ได้หลาย ประการ และมีอาการแทรก ค้างค่อ

1. รายไทยอักเสบ มักจะเกิดจากการติดเชื้อ ผู้ที่ญิ่ง
เบ็นมากกว่าชายเพราะ เชื้อโรคเข้าสู่กระเพาะบี้สภาวะง่าย การ
กระหนบกระแทก บี้สภาวะคั่ง โรคเบาหวาน ร่างกายอ่อนแย
ทำให้เชื้อโรคแพร่ทั่วจากกระเพาะบี้สภาวะเข้าสู่รายไทยโดยตรง
ทำให้มีอาการไข้สูง หนาวสัณ ปวกหัว อาเจียร บี้สภาวะชุ่น
ออกน้อย ปวกหลังสีเข้าม่วงและปวกห้อง การรักษา ถ้าเป็นโรค
เบาหวานควรควบคุมน้ำตาลในเลือดและบี้สภาวะ ถ้าเป็นค่อง
ลูกมากโดย ควรใช้แก่น ก้านน้ำมัน หัวกินต่าง น้ำชาให้มาก
ถ้ามีอาการมากให้อาหารญ้ำดอคปล่อง 1 ก้ามเมือ ตะไคร้กัน 1
ก้ามเมือ ข้าวเปลือก 1 ก้ามเมือ น้ำตาลกรวดก้อนเท่าหัวแม่มือ^๑
ใส่น้ำ 3 แก้วกาแฟฟท้มให้เดือดเหลือแก้วครึ่ง แบ่งกิน 3 เวลา
ก่อนอาหาร ถ้าหัวไม่ได้ใช้เมล็ดหอยญ้ำปากความทันน้ำกินก็ได้

2. เนื้อไอกอักเสบ มักเป็นร่วมกับรายไทยอักเสบ
เพราะเชื้อโรคลูกสามไปยังเนื้อไก่ได้ง่าย อาการค้าง ๆ คล้าย
คลึงกับโรคนี้ส่วนมากเกิดกับผู้ที่เป็นโรคเก้า การรักษาให้อา
หารตารางจิก 30 กรัม รากจ้าพริกสด 30 กรัม เปลือกแดง

โนแห้ง 20 กรัม ทั้มน้ำกินก่อนอาหารวันละ 3 เวลา

3. โรคไกอกอักเสบ โรคนี้เริ่มเป็นมืออาการไข้เจ็บก่อ เป็นไข้้นามาก่อนทำให้เกิดคออักเสบและทำให้อักเสบขึ้นที่กลุ่ม เลือกฟอยด์ควย ไครงไม่อาจจับกรองน้ำของเสียได้ จึงบวมหนอง เหนือย มีน้ำกังอยู่ที่ช้ายปอด ความคันสูง มีไว้ เจ็บก่อ บื้สภาวะน้อย อาจมีสีคล้ำเหลืองแล้ว บวมที่หนังตา ใบหน้า ตามทัว บางรายไม่บวมรักษา เพียงมีผิวนังตึงๆ การรักษาให้อาภัยรักษาพิเศษ 30 กลั้ม เมล็ดหญ้าปากควายแห้ง 15 กรัม ตะไคร้รักันแห้ง 20 กรัม หญ้าถุงคลื่อ จันเรยก็อก จัน เจ่า 15 กรัม ทั้มน้ำใส่น้ำยาลกรวบกินก่อนอาหารวัน 3 เวลา

4. โรคไกหย่อนสมรรถภาพ ตันเหตุเกิดจากโรคไก อักเสบเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความคันโรหิตสูง โรคเหล่านี้เองทำให้ไกขับของเสียอ่อนกำลังไม่สามารถขับของเสียออกมาก ให้ อาการที่เห็นได้ง่ายคืออ่อนเพลีย ซึ่ก เป็นอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน สะอึก เหนื่อยง่ายมีน้ำนมคัด การรักษาให้อาหาร กวาร์ฟอร์มาโนฟาร์มาร์ต์ แก้ไข้กระชายธรรมชาติ (ถ้าหาไม่ได้ใช้กระชายธรรมชาติ แทนก็ได้) ย่างไฟหรือกากแครอฟท์แห้ง หัวว่านเพชรน้อย หัวว่านมหากำลัง หัวว่านไฟ-ไฟร์แกง ยาหังสือย่างน้ำหนัก

เท่ากันหากแห้งบดเป็นผง . รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชาซึ่ง
น้ำรับประทานวันละ 3 เวลา ก่อนอาหาร ถ้าบีสสาวะไม่สะดวก
ก็ให้หยอดอุดปล้อง 1 กำมือ อะไคร์ทัน 1 กำมือ น้ำยาด
กรวค 1 ก้อนเท่ากัวแม่มือทันน้ำกินต่างน้ำชา

ต่อมลูกหมากโต

ผู้ป่วยมีอาการบีสสาวะถอนกลางคืน สายบีสสาวะเล็ก
และเริมน้ำสสาวะอ่อนหรือเบาลงมาก และใช้เวลานานกว่าจะ
บีสสาวะเสร็จ เมื่อจวนเสร็จบีสสาวะเป็นหยดๆ บางรายบีส-
สาวะไม่ออกรถะปานมาก ถ้ายังอักเสบด้วยยิ่งเจ็บมาก อย่าง
บีสสาวะตลอดเวลา มีไข้ หน้าสัน น้ำหนักกัวลดลงมาก
ถ้าใช้วิธีสวนบีสสาวะก็ยังทำให้เกิดอักเสบมากขึ้น การใช้อา-
รักษาให้ยา “นมควาย” (ไม้น้ำมอยู่สองชนิด อีกชนิดหนึ่ง
เรียก “นมวัว” มีลักษณะคล้ายกันต่างกัน แต่หลังใบสาเกคล้าย
กับกระชายทรัยซึ่งมีผลคึกกว่า) ให้อาเนกไม้นมควายฝานเป็น
ช้อนบางๆ แล้วย่างไฟให้มิก dein หอมกันน้ำกินต่างน้ำได้ผลคีมาก
ท่านที่ต้องการขอได้ที่วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

แท่ท่านที่เป็นต่อมลูกหมากโตต้องลอกอาหารจ้ำพวกເຟັກ

ร้อน เช่น พริกไทย ระวังอย่าถูกความเย็นเข้าหน้าวสัน อย่าให้เป็นหวัด อย่ากินน้ำส_usageานเกินควร

ยาแก้ปีคอดหลัง ปีคอดเอว ปีคอดตามหัว

1. ใช้รากจ้าพริก หรือแก้ว-ทะไนต์แก้ว-แก้วพริก ใช้สัก 30-60 กรัมก้มกิน

2. ใช้ใบชี้เหล็ก แก่นสะเกา กระดูกไก่ ปลาไหล เพือก ก้มน้ำกิน

3. ใช้เปลือกแตงโมเขียว ๆ ทากรในที่ร้อนให้แห้ง แล้วบดเป็นผงผสมเกลือกิน

4. ใช้รากพุดกานสัก 30 กรัม หันเป็นฝอยใส่ร่วมกับกระดูกทางหมู ใส่น้ำและเหล้าอย่างจะเท่ากันปริมาณพอควร แล้วกุ่นกิน

5. ใช้รากหญ้าเต็บมีอนาง มักแล้วก้มน้ำ 3 ส่วนเหตือ 1 ส่วน

ท่านที่ปีคอดหลังทรงกระถางกระดูกสันหลังหรือบริเวณไกต์ เกียงและท้าลงมาสามารถบริเวณกันกับ น้ำส_usageานอ่อนมีสีเข้มเหล่านี้

ນັກເກີດຈາກຂັບຮອຍທີ່ ນັ້ນກໍາງານນານເກີນໄປ ຂີ່ຈັກຢານຍິນທີ່
ຫລາຍໆ ຈົ່ວໂມງ ຕົມນ້ຳນ້ອຍ ພັກຜ່ອນນ້ອຍ ທຳໃຫ້ຮະດຸກແລະ
ກລັມເນື້ອສ່ວນຫລັງອັກເສນ ກ້ອງຈະວັງຍ່າໃຫ້ຢາແກ້ປັກບ່ອຍນັກ
ຢາເຫຼັນເນື້ອເພີ່ງແຕ່ຮ່ວນຄວາມປວກຈົ່ວຄຣາວ ຈະທຳໃຫ້ຄວາມປວກ
ທົ່ວໜຶນ ຄວາມພັກຜ່ອນແລະຕົມນ້ຳນາມາກໆ ດັ່ງນີ້ມາຄາປວກມາກຄວາ
ໃຊ້ຮູ້ຈົ່ງກຳພົມແລດ້າຂາວຄ້ວິໄຟໃຫ້ອຸ່ນ ແລ້ວທ່ອຜ້າປະກົບທີ່ປວກ
ຫວີ່ໂຮງໃຫ້ນ້ຳນັ້ນກັ້ງຝູຖາ ພຣີໃຫ້ເມັນທອດກັບການບູ້ຽນ້າຫນັກເທົ່າກັນ
ໄສ່ຂ່າວເລື້ອງໆ ໄວກ້ວຍກັນ ເຄີຍເຄີຍກົດລາຍເບີນນ້ຳນັ້ນ ໃຫ້ທາແກ້
ປວກຫລັງ ປວກເອວ ປວກການຂ້ອງ ປວກຫວັວ ແກ້ໜັກ ກັກນູກ

ຢາແກ້ບັດເບາ

1. ໃຊ້ຜັກກາກນ້ຳ 1 ກໍານົມໂ ໄສ່ນ້ຳ 3 ດັວຍ ຕົ້ມໄສ່ນ້ຳ
ກາສແກງກົນ
2. ໃຊ້ກັນເຫຍ່ອນແລະຮາກຕົ້ມນ້ຳກິນ
3. ໃຊ້ໃນທ່ອງພັນຈຶ່ງທາກແໜ້ງຮັງນ້ຳກິນ
4. ໃຊ້ຮາກຫຼັ້າຄາຕົ້ມນ້ຳກິນຕ່າງໜ້າ
5. ໃຊ້ຮາກຫຼັ້າປາກຄວາຍທັງກັນຕົ້ມນ້ຳກິນ
6. ໃຊ້ຫຼັ້າຫນວັດແນວຕົ້ມນ້ຳກິນ

7. ใช้เหง้าหรืออุกสับประคบมั่น้ำกิน
8. ใช้น้ำผึ้งดองปลังท้มน้ำกิน
9. ใช้น้ำผึ้งไทรคั่มน้ำกิน
10. ปวกหลังอ่อนเพลียบสี蒼白ขี้ก็ให้อาทะไกรรังกัน
หันแต้วคว้าให้แห้งชงน้ำร้อนกินท่าน้ำชา

โรคหัวใจ

ท่านที่เป็นโลหิตในหัวใจคันหรืออุกคัน ควรรับประทานกันหอมสดหรือหัวหอม หรือกระเทียมสดจะช่วยลดไขมันในเส้นโลหิตของท่านให้เป็นปกติได้ โดยใช้กันหอมสดปรับประทานกับอาหารมื้อหนึ่งประมาณ 5-6 คัน ถ้าเป็นหอมเด็กครั้งละ 4-5 หัว ให้ติดต่อกันประมาณ 10 วัน หรือหอมหัวใหญ่ครั้งหัวโดยใช้จิ้นช้อนหรือปูรุ่งกับปลาเค็มน้ำดอง กับเหنمบ้าง กับสลัดบ้าง หรือใช้ตอกคำฝอย 1 หยิบมือ ตอกเก็บชวยประมาณ 10 คงกอก ใส่น้ำ 2 แก้วท้มน้ำกิน อนึ่ง โรคหัวใจนั้นมีอยู่หลายประเภท คือหัวใจร้าว หัวใจคันอุกคัน หัวใจบวม และอื่นๆ ท่านที่เป็นโรคหัวใจควรกินผักกระดิ่นคิบๆ ให้มากเป็นประจำ หรือหัวผ่าายเท่าจันน้ำผึ้งกินเข้า-เย็น

ท่านที่เป็นโรคหัวใจครองกระเพยจากเหล้า บุหรี่ น้ำอั้ก-ตัน กานแฟ และควบคุมอาหารรับประทานแต่พอกควร งกพอก ไขมนันกำง ฯ ระวังอย่าให้อ้วนมาก ควรบริหารร่างกายด้วยการ แก่วงมือ

ยาแก้ต้มเน้นหน้าอกหายใจไม่สะดวก ใช้หัวหรือแข้ง ของว่านไฟ-ไฟรแดง จีนเรียกเต้งเกี้ย ทั้มน้ำกิน

โรคปอด

1. ปอดอักเสบ ผึ่นปอด มีหนองในซ่องปอด ใช้ หญ้างวงช้างหง่านกันสก 60 กรัม ทั้มน้ำผสมน้ำผึ้งกิน หรือต่ำกัน เอาน้ำผสมน้ำผึ้งกิน

2. ปอดอักเสบ มีหนองในปอด วัณโรค และโรคปอดอื่นๆ ใช้พั่าทะลายใจรากหง่านสก 20-30 กรัม ทั้มใส่น้ำกัด แหกกิน หรือแห้งบดเป็นผงทำเป็นเม็ดมะละกอกินครั้งละ 20-30 เม็ด แต่ถ้องรับประทานติดต่อให้นานหน่อยจะหายขาด

โรคหัว

1. ทันอักเสบเฉียบพลัน ทำให้กัวเหลืองไว้เง่าพูทธ-

รักษา 60-90 กรัม ต้มน้ำกินวันละ 3 เวลา ก่อนอาหาร กิน กิจกติ่งประมาณ 7 วันจะเห็นผล ควรเหลืองจะหาย

2. ใช้รากมะเดื่อหอม กินแก้วกับทรุกกับพิษที่กับแตะปอก

3. ใช้ใบเงินใบทองกินแก้วกับทรุก กับพิษที่กับแตะปอก

4. กับอักษะใช้กับโกร์ไม้รุ้ลัม ใบหัวนาท กอกหอม ใจดีต้มน้ำกิน

ชาตุพิการ ใช้ใบมะขามหากแห้งชงน้ำคึ่ม นอนไม่หลับ ใช้เมล็ดชุมเห็ด (ไห) กัวให้กำ แต้วชงน้ำกิน

โรคบิด

บิดมีสองชนิด คือชนิดบิด กัว และไม่มีบิด ชนิดบิดกัว มีกันเหตุเกิดจากเรื้อรولا “ยาเม็ด” เข้าสู่ร่างกายทางอาหาร น้ำ และเครื่องคึ่ม เรื้อนจะทำให้ลำไส้บีบแน่นและ มีໄสหิทกในล ซึ่ม ทำให้ผู้ป่วยอ่อนเพลีย มีอาการท้องร่วง อุจจาระเป็น หนอง นุก เสือก ถ่ายบ่อย ๆ หรือกลอยคลเวลา ป่วยเบ่งหรือมี

ไข้ โรคน้ำร้ายแรงต้องรับกินยา

ศัพชาสมุนไพรที่ใช้รักษาได้ผลดีมีดังนี้

1. รากผักโขมหนามสก 60 กรัม ว่านกาบหอยใช้ใบสก 30-60 กรัม รวมทั้งน้ำผึ้งหรือน้ำตาลແກงกิน
2. ใช้ก้นผักเบี้ยสก 1 ก้านเมือ สก 90-120 กรัม ทั้งน้ำผึ้งน้ำตาลແກงกิน
3. ใช้ก้นกะเม็งกัวเมีย จันเรียงເຊັກນັກເຊົ່າ ใช้ก้นสก 60 กรัมทั้งน้ำกิน
4. ใช้วากหญาขักบอน จันเรียงນวยเนັກເຊົ່າ 30-60 กรัม ทั้งน้ำใส่น้ำตาลແກงกิน
5. ใช้ใบฝรั่งสก 30-60 กรัมทั้งน้ำใส่น้ำตาลແກงกิน
6. ใช้เปลือกโนกหลวง เปลือกถุงกับทิม และเปลือกมังคุดอย่างละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน ใส่น้ำพอท่วมยา ทั้งหมดให้เค็อกประมาณ 10 นาทีแล้วยกลง พ่ออุ่นๆ รับประทานครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะ ก่อนอาหารวันละ 3 ครั้ง กินประมาณ 2-3 วันจะหาย ห้ามกินมากจะทำให้นอนไม่หลับ และเกิดบื้นบุ่นในท้องถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้คำารันเตย
7. ใช้วากกระท้อน 30-60 กรัมทั้งน้ำกิน

8. ใช้แก่นมะขามกัมนำกิน

9. ใช้รากพังงูเขียวสด 30 กรัม ใบชาเก่า 10 กรัม
ใส่น้ำ 2 ถ้วย กัมเหลือ 1 ถ้วย แบ่งกิน 3 เวลา

บิกชนิกไม่มีกัว เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด เข้าสู่ร่างกายทางอาหารและเครื่องคิมที่สกปรก โรคนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยอุจจาระบ่อย ๆ ปวดเบ่งอย่างต่อเนื่องโดยตลอดเวลา อุจจาระตอนแรก ๆ เป็นน้ำ ต่อไปเป็นน้ำนมและโลหิตปนเล็กน้อย ในระยะหลังจะมีน้ำนมและเหลือง ผู้ป่วยจะกระหายน้ำ น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ต้องรับรักษากับผู้ป่วยอนพักให้เพียงที่ เอาจริงร้อนประคบหน้าท้องไว้เสมอ กินอาหารเหลว เมื่อห้องร่วงหยุดให้คิมน้ำมาก ๆ ตัวยามีคัน

1. ใช้พืชละลายโจร 30-60 กรัมกัมนำใส่น้ำตามแต่กิน หรือใช้ก้นแห้งบดเป็นผงทำเป็นเม็ดกินวันละ 4 กรัม

3. ใช้รากหญ้าขัดบอน 30-60 กรัมกัมใส่น้ำผึ้ง หรือน้ำตาลแต่งกิน

4. ใช้เครื่องหมายแกง (ภาคเหนือ) กระทุงถ่าย (ภาคกลาง) ใช้ใบ เดา รากกัมนำกิน

5. ใช้ถั่วอกคำไทหรือใบกัมนำกิน

6. ใช้ใบฝรั่งก้มน้ำกิน หรือใช้เบปเลือกผลทับทิมก้มน้ำกิน

7. ใช้น้ำปูนใส (ปูนแตงกินกับหมาก) 1 ถ้วยกะໄຕชันผง (ชันยาเรือ) ตะลایพอดคัมไก้อ่าย่าให้ชันนัก กินเข้าไป 10 นาทีหายขาด

8. ใช้กันน้ำน้ำมาราชสีห์แห้ง 15-30 กรัม บิดเป็นเลือดใส่น้ำตาลทราย ถ้าบิดถ่ายเป็นนุกใส่น้ำตาลແคงใส่น้ำสุกคุณเยาน้ำกิน

ยาแก้อหัวหืดกโรค

1. ใช้ผึ้งมะกรุก 1 ชีกฝานເອາເเฉພະຜົວ กับพริกไทยร่อน 20 เม็ด ตำให้ลุกເອີຍຄົມສມກับสຸຮາຫາວຽງຄົງถ້ວຍชาກິນທັນທີໃນຂະດະທີທັງຍັງເຄີນອ່ອຍ່ອງຍ່າງແຮງຈະຫຍຸດທັນທີໃຊ້ໄກພົດຄົນາກ

ยาแก้ไขขับสันและอาการ

ທັນແທກເຖິກຈາກພາຫີຂອງເນັກໂລທິກ 3 ຂົນິກ ຄືອທຳໄຫ້ມີອາການ “ຈັບວັນເວັນສອງວັນ” ມີນີ້ຍືນາກ “ຈັບວັນເວັນວັນ” ພບນາກ “ຈັບຖຸກວັນ” ພບນາກແລະຮູນແຮງ ອາກາຣහນາວສັ້ນ ມີໃໝ່ສູນນາກ ຈັບເປັນເວລາແລ້ວແກ່ພາຫີຊືນິກໄກ ກາຣຈັບໄຊ້ແນ່ງເບື່ນ

4 กอน คือ

1. เริ่มเป็น มีอาการปวดทั้ว ครึ่นเนื้อครุ่นทั้ว ง่วงเบื่ออาหาร เนื้อหน่ายการงาน ปวดกระดูกท้าวไป อาเจียน ความร้อนของร่างกายสูงขึ้น เป็นอยู่ทั้งวัน
2. ต่อมารีบมีอาการหนาวสัณ্হ สั่นทั้งทัว รู้สึกหนาวมากหนาวจนคงสัณห ห่มผ้าเท่าไหร่ก็ไม่หายหนาว ผิวนังเย็น แต่คล้ำ ทัวร้อนจัด อาเจียน ปวดหัวมาก ถ้าเป็นเด็กเล็ก ๆ จะเพ้อกลั้งอาจซักได้ ระยะนี้เป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
3. เมื่อหมดระยะหนาวจะรู้สึกอบอุ่นขึ้น สะบัดร้อน สะบัดหนาว และรู้สึกร้อนขึ้นทุกที ๆ ร้อนแผ่ไปทั่วทัว รู้สึกร้อนอย่างรุนแรง ต้องรับเอาผ้าห่มออก หน้าแดงผิวแห้งและแสบร้อน ปวดหัวจัดเหลือ อาเจียน กระหายน้ำ ความร้อนสูงมาก ระยะนี้เป็นเวลาประมาณ 1-4 ชั่วโมง
4. พอกัวหายร้อนหรือไข้สร่าง เริ่มสบายขึ้นเหงื่อจะเริ่มออก และออกมากจนท่วมทัว ความร้อนจะลดลงเร็ว ผู้บวมจะพกนอนหลับได้นาน พอกันขึ้นร่างกายปรกติเหมือนไม่เป็นบวมมาก่อนเลย ทำงานได้อย่างปกติ ระยะนี้เรียกว่า “ระยะฟื้กทัว” แล้วจะกลับเป็นอีก ถ้าไม่รับรักษาจะเป็นโรค

ໂລທິກຈາງ ພອມເໜືອງ ກ້ອງນ້ອງ ນ້ຳນໂກ ນ້ຳກັນຍ່າໄຫຼູງ
ກັກ ກິນຂາຫາຮ່າດວ ດ້ານໄຟສຸງເຊົ້າກົວກັວຍນ້ຳເຢັນ

ຍາຮັກໝາໄນ້ມາລາເຮີຍ – ໄບບັນດັບ

1. ທຸ່າລື້ນງູ ຈິນເຮີກໂຈ້ວຈີເຊົ້າ ໃຊກັນສກ 30 ກຣັນ
ກົມນ້າກິນ

2. ໃຊວາກພຶ່ງງູເຊີຍ ຈິນເຮີກເບົ່ນປີເຊົ້າ ໃຊວາກສກ 30
ກຣັນກົມນ້າກິນ

3. ໃຊກັນຜັກຄຣາກທັງແຫວນ ຈິນເຮີກເຖິງນັ້ງເຊົ້າໃຊສກ
30 ກຣັນ ກົມນ້າໄສ່ນ້າຕາສແກງກິນ

4. ໃຊ້ຫຸ້າໄຕໃນຄົ້ນໄຫ້ແໜ້ງ ແລ້ວກົມນ້າໄສ່ນ້າຕາສແກງກິນ

5. ໃຊ້ຫຸ້ານ້ຳນມຣາຊສີ່ຫໍ່ ໃຊ້ໄກ້ທີ່ 2 ຜົນິກສກ 30–
50 ກຣັນ ກົມກັນເນື້ອໜຸແກງ ອົບນ້າຕາສແກງກິນ ອົບຄາກແໜ້ງ
ນົດເບື່ອຜົນຜົນນ້າຕາສກຽວກິນ

6. ໃຊວາກພຸມເວີ່ງແລະຫຸ້າສຸກໄຕໃນກົມນ້າກິນ

ຍາຮັກໝາໄນ້ມາເຮີຍຂຶ້ນສມອງ ມີອາກເພື່ອຄລົ່ງໄຫ້ເອາໄນ
ນະໜານ 3 ກຳມືອ ນໍາມາຕຳກັນເອົານ້າຜົນຜົນເຫຼັກຂາວທີ່ນີ້ເນັກ ໃຫ້
ກິນໄໝວັນປະທານ 2–3 ກຣັງຫາຍົດ

ยาแก้ชาใน

1. น้ำกาลทรัยແກງ 3-4 ช้อนโถะ เหล้าขาว 1 กົງ
ผสมกันกิน

2. ใช้หัวกะไคร้กันให้เกือกนานครึ่งชั่วโมงกินครั้งละ
1 ถ้วย (250 ซี.ซี.)

3. ใช้ในกระฤกคำหรือกระฤกไก่คำ Jinreyik Iowku^๑
อังกัน ใช้ในสกคำคั่นເອນ้ำผอมเหล้าขาวรับประทานแก้ไอ
และอาเจียรเป็นเดือด แก้การชาซอก เช่น ทอกจากที่สูง หรือ
หากลั้นกระหบกระแทกกันของแข็ง ถ้าข้าบวนเขียวภายในอกให้
ใช้ใบคำผอมสุราประคบหรือพอกที่ป่วย

4. ปวยข้อหรือเคล็ดข้อยกใช้แห้งเจกมูลเพลิง 1.5-
3 กรัม ต้มน้ำหรือแซ่เหล้ากินครั้งละ 5 มิลลิกรัม วันละ 2
ครั้ง.

5. เกล็ดข้อยกป่วยบวม ฟอกชา ใช้ใบสกตันสนบุ้งขาว
ภาคเหนือเรียกมะໂห່ງหงเหก ใช้ใบสกคำพอกบริเวณที่เป็น

6. กระฤกหัก ใช้เปลือกของกันสนบุ้งขาวร่วมกับกันสน
กบและพริกไทย 4-5 เม็ด ตำผอมเหล้าขาวแล้วผัดให้อุ่นพอก
ให้หนาแล้วใช้ไม้พับผ้าให้แน่น

คุณประโยชน์ของมะนาว

1. เป็นหัวค ใช้หัวค มีอาการเจ็บคอและไอ ใช้น้ำมะนาวผสมกับเกลือ จิบทีละน้อย ๆ แต่จิบบ่อย ๆ

2. มีอาการไอ หรือเสียงแห้งแห้ง ให้เอามะนาว 2 ถูก ปอกเปลือกนอกออก แล้วผ่าซีกใส่เกลือพอควรลงไว้ในปากให้น้ำมะนาวค่อย ๆ ไหลลงลำคอ หรือใช้น้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง ก็มีแก้ไอเจ็บคอ

3. ไอมีเลือด ใช้มะนาว 4 ถูก เกลือพอควรให้มีรสมัน แล่น้ำผึ้งพอหวาน กินหลังอาหาร หรือใช้ใบมะนาว 108 ใบ เพลี้ยจิกนั้น 11 ตัว ปูนขาวหนักประมาณ 4 บาท วิชทำ กินน้ำมะนาวใส่เพลี้ยจิกนั้นและปูนขาวใส่ป่นกัน คงประมาณ 3 คืน รับประทานครั้งละ四周ชา แก้ไอเป็นเลือดค

4. ปวดศีรษะ ใช้มะนาวฝานเบ็นซีกบาง ๆ แล้วเอาปูนที่กินกับหมากและเดงท้านหน้ามาราด น้ำคาก็กรองขมน อาการปวดจะค่อยหายไป และถอนเข้าใช้น้ำมะนาว ผสมกับน้ำกาลสัก 1 แก้วกิน จะช่วยให้หายจากโรควิงเวียนและปวดหัว

5. แก้ไข้ นำใบมะนาวมาหั่นฝอย ๆ ซงคัวยัน้ำเค็อก คัมแบบน้ำชาจะช่วยลดไข้ และใช้มอกถั่วคอผ่าเชื้อโรคได้ค

6. เป็นลมวิงเวียน อย่างอ่อนเยี้ยน หรือมีอาการรีดอัดใช้มะนาวผ่าซอกโดยเกลือบ่น ใส่น้ำกษาตรายข่าวสักนิด บีบกินลงไปพักเที่ยวก็หายเป็นปลิบตั้ง ไม่ว่าจะเป็นอาการคืนໄ้ส จากการมีครรภ์ หรือเมารถ แพ้อากาศ มะนาวช่วยคุณได้ หรือใช้มะนาวจมูกเลือดออกไว้ในปากสักครู่ จะรู้สึกสดชื่นจากการเป็นลมวิงเวียนหน้ามืดได้ หรือใช้เบลือกมะนาวชี้ให้ก้มก็ได้

7. เก็งหกล้มหัวในปุ๊ก หรือฟกช้ำตามแขนขา ใช้แบ่งกินสองสองกับน้ำมะนาวทารองที่ข้างบนสักพักใหญ่ๆ อาการปวดบวม บวม ปุ่กจะยุบ หม่นทาวันละ 2 ครั้ง ภายใน 2 วันจะหายไปเอง

8. แก้ชางคุ่มในคอเด็ก ขับเสมหะ เม็ดออกในปาก ใช้เม็ดมะนาวเผาไฟบ寇ให้ลักษณะเดียก ใช้น้ำมะนาวหรือรากของมะนาวฝานกับน้ำเป็นกระสาย ผสมเข้าด้วยกันแล้วกวนชางเด็ก หรือเอาน้ำมะนาว 1 ข้อนชา แล้วเอารากมะนาวมาผูกให้ขันคี แล้วต้มกับเด็กสัก 2-3 ครั้งก็หาย

9. เม็ดมะนาวใช้เกี้ยวกินขับเสมหะ ใช้กิ๊กท่อ กัน 7 วัน ไก่ผัดคี

10. ท่อ母คลชินอักเสบ เอาน้ำมะนาวผสมกับน้ำผึ้ง

ແລະນ້ຳປຸ່ນຫາວ ຄົມໄກ້ຜົດກີ

11. ກະຖຸກົດືກໂຄໂອ ໃຊ້ນ້ຳມະນາວໃສ່ເກລືອແລະນ້ຳກາຕົນິກ
ທັນຍໍ ກຽວກັງໄປທຽງກັງທີ່ກົດືກໂຄໂອນໄວ້ສັກຄູ່ ແລ້ວຈຶ່ງກ່ອຍ
ກົດືນ ກັງຈະອ່ອນກົວທຸກຄົງໄປໃນກະເພະ

12. ກັງປຸ່ນືກົດືກໂຄ ຜົງທ່າໄທຮ່າຄາຜູ້ ໃຊ້ມະນາວຝານ
ແລ້ວອນໄວ້ໃນປາກຈົນຮູ້ສຶກເປົ້ອງເຈືອງຈາງ ທຳສັກ 2-3 ທີ່ ຈະທ່າ
ໄທກັງທຸກຄົດອອກໄປໄດ້

13. ສັນເບີນຝ້າ ໃຊ້ສໍາລື່ບມະນາວເຊື້ອລື້ນວັນຕະ 3 ກຣົງ

14. ສົວຝ້າ ໃຊ້ນ້ຳມະນາວຝານກັນ ແນ້ນ ດິນສອ ພອງທາ
ກ່ອນນອນທຸກວັນ ດັ່ງເບີນສົວຫັວໜຸ່ມໃຫຍ່ໄທເອົານ້ຳມະນາວ 1 ໃຫ້
ຫາວ 1 ຜົມກັນແລ້ວແກ້ມທີ່ກຸ່ມສົວ ຜູ້ທີ່ໄມ້ມີສົວໃຫ້ທານາງ ຖ້າ
ໄປປະປາຍ 30 ນາທີ ແລ້ວຈຶ່ງລັ້ງອອກ ຈະທ່າໄທຜົວໜັງນິ້ນວັດ
ອູ່ເສນອ

15. ໃຊ້ນ້ຳມະນາວທາຜົວໜັງ ທ່າໄທໜຸ່ມຂຶ້ນໄມ້ແຕກກວ້ານ

16. ຂາລາຍ ມີຈຸດຄ່າງດຳເນືດເລືກ ໃຫ້ເອົານ້ຳມະນາວ
ກັນດິນສອພອງຜົມກັນ ແລ້ວທາຖຸກ ດິນກ່ອນນອນ ຮູ່ເຂົ້າລັ້ງ
ອອກ ທ່າໄປທຸກວັນຈະຫຍາ

17. ແກ້ກລາກເກລືອນ ທິກ ໃຊ້ນ້ຳມະນາວຝານຜົມກຳນະດັນ

ທ່ານວິໄລ

18. ແກ້ສັງຄັງ ໃຫມະນາຜ່າຊືກທາກ່ອນນອນ ແຕະຫລັງ
ກືນນອນໄມ້ກ່ຽວກຳຫຍ່າຍ

19. กัน มีเม็ดผลที่ตามแขนขา ใช้มะนาวทักษะ
ลูก ร่วมไฟฟ้อยู่่ ถูกามที่กันภายใน 2-3 วันจะหาย

20. แก้ปั้นชิเมนต์ก็ค์ ใช้น้ำมะนาวทา

21. แก้ไขแก้ไข ใช้น้ำมนต์น้ำทากที่คุ่มกันทึ้งไว้ให้แห้ง ถังน้ำฝนบ้วนแล้วเช็ดให้แห้ง แล้วเอาเบี้ยงทากทุ่มกันจะหาย

22. รายแพลเป็นจากอุบัติเหตุ ใช้น้ำมันน้ำผึ้งคิน
ถือของท่านริเวณที่เป็น จะทำให้ไม่ค่า

23. ถ้าไกรถูกค้วหนอนแล้วกัน แต่ยังไม่เป็นผล
เป้อย ให้อาบน้ำผ้าซักถูกทรงที่กัน ถ้าเป้อยเป็นผลแล้วให้
อาบน้ำไม่รู้โดยมาทำกับปุนที่กินกับหมาก ผสมน้ำเล็กน้อยท่า
ทรงผลเป้อย รับรองหาย

24. กับกลีนเก่า ใช้น้ำมะนาวทารักแร้รึน้องกับกลีนเก่า

25. แก้ปัจจัย ใช้รากสก ฝันกับเหล้าท่า หรือชูก
เอาผิวผลนงนาวดมกับปูนแครงบีกผีจะหาย

26. ผู้มีภารกิจ ใช้ลักษณะน้ำคิวต์ในออกให้อ่านนัว

เข้าไปได้ แล้วเอาปุ่นແကງໄສ່ໃນ ສວນໜັງມືອເຂົ້າໄປພາກປວກຈະຫຍກ

27. ແກ້ໄຟດວກ ນ້ຳຮັບຄວກ ໃຫ້ເອົານ້ຳມະນາວະໂໄມນ ບຣິເວັດທີ່ດຸກ ຈະຊ່ວຍກັບພິຍປວກແສນປ່ວກຮັນໄດ້

28. ແກ້ຜິວໜັງຝົກຊ້າ ໄໃຫ້ນ້ຳມະນາວຸຜສມກັບຄືນສອພອງທ່າທີ່ຜິວດຸກກະແທກ ເຊີວ ພົກຊ້າ ອຣອນວນໂກ ຈະຫຍຍເບື້ນປົກທີ່

29. ແກ້ນາກທະຍັກ ເມື່ອດຸກທະບູກໍາ ທ້ານາເກີຍວ ອຣອດຸກຂອງທີ່ມີຄມ ເອົານ້ຳມະນາວົນໃສ່ແຜດທີ່ເບື້ນນັ້ນ ຈະນັ້ອງກັນນາກທະຍັກໄດ້ກີ່

30. ທ້ານານັກທັກຄາ ໄໃຫ້ນ້ຳມະນາວກັນນ້ຳມັນກັບປາໄສ່ທີ່ແຜດ ຈະຄຸກທ້ານາມອອກ

31. ແກ້ເລີ້ນຂຶນ ເອົານ້ຳມະນາວຸຜານກວງສ່ວນຫົວອອກຂາກພອສອນໜັງເຂົ້າໄປໄດ້ ໃຊ້ມີຄວ້າເອາເນື້ອໃນອອກເລັກນ້ອຍ ເວົາປຸ່ນແກງທານາງໆ ແລ້ວເອົານ້ຳສອດເຂົ້າໄປ ແລ້ວຖົງໄວ ທຳກັນໜີ 2-3 ກຽງຈະຫຍາ

32. ແກ້ພິຍແມດງສັກວົກກັກທ່ອຍ ໃຊ້ນ້ຳມະນາວພອກທີ່ແຜດໄວ 2-3 ນາທີ ແລ້ວເປັນໃໝ່ ຈະຫຍປວກ (ກະຈານ ແມດັບປ່ອງ)

33. ແກ້ປ່າດຸກທັກ ໃຊ້ນ້ຳມະນາວຜ່າຫຼືກແລ້ວກົກຫຣອດຸກຮົງ

รอยป่าคุกยักษ์ สักพักหนึ่งจะหายไปใน 4-5 นาที

34. รากชาโกรกระเพาะ ใช้เปลือกผื่นระหว่างน้ำร้อนคั่ว เป็นยาขับลม และแก้โกรกระเพาะได้

35. แก้ปวกท้อง ท้องอืด ท้องเพ้อ ใช้น้ำมะนาวผสมน้ำตาลกิน

36. เด็กท้องอืดร้องกวนในเวลาเดลากิน เอายุ่นแกงชี้ลิบบนผ่านมือ บีบนำ้มะนาวคลุกให้ทว้า แล้วทาท้องเด็ก สักครู่หนึ่งเด็กจะผายลม 2-3 ครั้ง และจะหยุดร้องไห้

37. แก้ท้องร่วง ใช้น้ำมะนาวผสมกับน้ำสะอาดคั่ว

38. ท้องผูกใช้น้ำมะนาวค่อนแก้วกาแฟ ใส่เกลือเล็กน้อยคั่วทุกวัน เป็นยาระบายได้คิดทำให้เจริญอาหาร

39. แก็บิก ใช้น้ำมะนาวกับน้ำผึ้ง หรือปูนใสอย่างละเท่ากัน กินครั้งละ 2-3 ถ้วยกะໄล

40. แก้อาหารเป็นพิษ ใช้น้ำมะนาว น้ำปูนใส ใส่เกลือให้มีรสเค็ม กินครั้งละ 1 ช้อนໂต๊ะ

41. แก้ผิคสำแดง ใช้รากมะนาวฝنกับน้ำซาวข้าว กินแก้ผิคอาหาร เช่น เวลาบวมไข้กินอาหารผิคสำแดง

42. แก้น้ำสตัวจะบวบปริบจะป่วย ใช้ใบมะนาวสดก้ม

น้ำใส่น้ำกາຕົກ

43. ພອກໂລທິກ ໃຊ້ໃນມະນາວ 7 ໃນ ທັນນໍາກິນຄຽງ
ຕະ 3 ດັວຍໜາ ວັນລະ 3 ເວລາ

44. ແກ້ວະຄູ່ຂາວ ໃຊ້ນໍາມະນາວ 2 ຂ້ອນໜາ ເກລືອ
ນໍາກາລີນິຄຫ່ອຍ ພສມນໍາສຸກ ໄສ່ນໍາແຊັງກິນແກ້ສຕຣີມີຮະຄູ່ຂາວນາກ

45. ແກ້ໄຟ້ກັບຮະຄູ່ ໃຊ້ໃນມະນາວ 100 ໃນທັນນໍາກິນ

46. ແກ້ນໍາເຫດືອງເສີຍ ໃຊ້ໃນມະນາວ 108 ໃນ ເກລືອ
3 ຂ້ອນກາວ ທັນກິນຄຽງຕະຄຽງແກ້ວ ວັນລະ 1 ຄຽງກ່ອນນອນ

47. ແກໍລົມເງິຍນ ໃຊ້ໃນມະນາວທັນນໍາກິນກັບຢາຫອນ



คุณประโยชน์ของว่านยาสมุนไพร

พัทลักษยโจร (น้ำลายพังพอน)

มีราก เป็นยาเย็นไม่มีพิษ ใช้แก้ร้อน แก้พิษ บวม
บิดจากแบกที่เรียกว่าต่ำเฉียงพลัน กระเพาะอักเสบ ลำไส้อักเสบ
ปอดอักเสบ มีหนองในปอด วัณโรค กอเจ็บ หลอดคลอดอัก-
เสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ถุงน้ำคืออักเสบ ความกันโลหิตสูงชน
เมือการปราศภัยให้เห็น แพดบวนอักเสบมีหนอง แพดไฟและ
น้ำร้อนลวก งูกัด คางทูม หูชั้นกลางอักเสบ ปากอักเสบ

วิธีใช้ ใช้หั้งคันแห้ง 5-10 กรัม บดเป็นผงชงน้ำ
หรือทำเป็นยาเม็ด ใช้ภายนอกทั้งน้ำชาด้วย หรือผสานน้ำมัน
พิชทาหรือพอกแพด

โรงเบาหวาน ใช้กับพัทลักษยโจรผสมกับเอ็นเหลือง
และกระชายคำ ทำเป็นยาเม็ดกิน

ว่านรองจีด หรือ ชางจีด

มิกส์นหอมมัน และมีรากเผื่อนกินห่ออย

สรรพคุณ แก้ยาเบื้องเม้า แก้ลมเพลมพัก เช่น ยา
ฝ่าพวงแมลงค้าง ๆ ໄโค้ดล็อก

วิธีใช้ เอาหัวทำผอมกับน้ำชา ข้าวกลอกปากเข้าไป
ไม่ว่าสักวันหรือคืน ถูกยาเบื้องชนิดใดก็ตามเมื่อกินยานี้แล้วหาย
แล้ว ถ้ากินเป็นประจำจะช่วยดอนพิษต่างๆ ในร่างกาย และยัง^{เป็นยาอาชญาภัยอีกด้วย}

ที่สวนสมุนไพรวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ต. ถุเทพ
จังหวัดเชียงใหม่ มีคลายชนิดท่านที่สนใจคิดค่อชมได้

ว่านไฟ - ไฟลแดง - เลี้งเกี้ยว

มีกลิ่นหอม รสขมเผ็ดหวาน เป็นยาสุขุม

สรรพคุณ ใบใช้แก้ครรนเนื้อครรนทัว แก้เมือยขบ
กอกช่วยกระหายเลือก อันเป็นล้มเป็นก้อนให้ถูก รากรแก้เลือก
กำเตาออกทางจมูก แก้อาเจียรเป็นโลหิต หัวหรือแห้งทั้นน้ำ
กินแก้ท้องผูก ท้องเพ้อ เเรอเปรี้ยว ลมแన่นหน้าอก หายใจ
ไม่สะดวกและสงบ ขับถูกประจำเดือนของสตรีให้เป็นปกติ

หมายเหตุ ถ้าสะสมธรรมคากาวยใจลึกๆ หรือแหงน
หน้าเพ่งคูเพคานอาจการก็จะหายไปเอง ถ้าสะสมคิดคือกันเป็น
หลายๆ ชั่วโมง หลายวัน หลายเดือน เอาจ่าวันนี้ประจำเดือนสัก
30 กรม ทุบให้แตกใส่น้ำประจำ 300 ซี.ซี. ทั้มเหลือ 200
ซี.ซี. กินเข้าไปไม่กี่นาทีหาย และยังรักษาโรคต่างๆ อีกมาก

คำไทย - คำเงาะ - คำแซด

ໃນ มีรժขนຳຝາກ ເປັນຍາຮສຸຂູນ ໃຊ້ແກ້ກີ່ຫ່ານ ເຈັບຄອດຕາໄ້ ແກ້ບົດ ຂັບນີ້ສາວະ ເລືຍກຳເກາອອກ ໃນໃຊ້ພອກຜີ່ ແລດອັກເສນໄກ້ອົກກ້ວຍ

ຄອກ ໃຊ້ເປັນຍານຳຮຸງເລືອກ ແກ້ໂລທິກຈາງ ສກວິກີມຮອນເກືອນຜົດປົກຕີ ແກ້ແສນຮັນກາມຜິວໜັງ ແກ້ຄັນ ແກ້ພິມແກ້ບົດ ແກ້ໄກພິກາຮ

ເມລື້ດ ເປັນຍາລົດໄ້ ຝາກສານ

ເບື້ອໜຸ່ມເມລື້ດ ເປັນຍາຮນາຍ ຂັບພຍາຫີ ແກ້ໂຮກຜິວໜັງ ແກ້ໄ້ ແກ້ສຶກາຫາຮ (ເອາເມລື້ດມາແຊ່ນໜ້າສັກ 2-3 ວັນຈນ ດອກທະກອນ ເອາກະກອນນາເຄີຍ ແລ້ວກາກແໜ້ງ ໃຊ້ທຳສິຜົນອາຫາຮ)

ຮາກ ມີຮ່ານຳຝາກ ເປັນຍາຮອນ ແກ້ປັກການຂ້ອງ ປວກພື້ນ ປວກເມື່ອທ ລໍາໄສ້ອັກເສນ ນົດ ມີກວດໃນກະເພາະ (ມາກເກີນໄປ) ປະຈຳເກືອນໄມ່ປົກຕີ

ວິຊ້ໃໝ່ ໃຊ້ກັງຕະ 15-30 ກຣມ ທັນໜ້າຮັບປະທານ
ໄາຍນອົກໃຊ້ກຳພອກ

1. ข้าวโพด มีรสชุ่ม สุขุม ไม่มีพิษ ใช้เป็นยา
ได้ดังนี้

1. แก่นบัวน้ำ โดยใช้ยอดเกสรทั่วเมียแห้ง 60 กรัม
ก้มน้ำรับประทาน โดยไม่ต้องใส่เกลือแกง

2. ไกอกะ煅 หรือเรเมเบ็นนวท์ไก ใช้ยอดเกสรทั่ว
เมียพอประมาณ ก้มให้จันขันแล้วใช้รับประทาน

3. แก่น้ำใช้ก้นและใบสดหรือแห้ง ก้มน้ำกิน หรือ
จะใช้รากแห้ง 120 กรัมก้มน้ำกินก็ได้

4. ขันบ๊สสาวะ ใช้ยอดเกสรทั่วเมียหรือชังข้าวโพด
ก้มน้ำกินแทนน้ำชา

5. ทำงานหนัก ไอเป็นเลือด ตกเลือด ใช้ยอดเกสร
ก้มกับเนื้อสักรักษา

6. เบาหวาน ใช้ยอดเกสรแห้ง 30 กรัมก้มกับน้ำ,
รับประทาน

7. ความคันโลหิตสูง ใช้ยอดเกสรแห้ง เปลือกແ teng,
โนแห้ง เปลือกกลวยหอมแห้ง อย่างละเท่าๆ กัน ก้มกับน้ำ
รับประทาน

8. ท้องร่วง ใช้ชังข้าวโพดเผาเป็นถ่านบดผสมน้ำรับ
ประทาน

2. ขี้เหล็กเทศ (กิมเท้า) จัน มีรากชุ่ม ชม เป็นยาเย็น มีพิษเล็กน้อย ใช้กัดล่อนกับ ทาส่วนบ้ำรุ่งกะเพาะอาหาร ทำให้การขับถ่ายดี แก้ระบบการย่อยไม่ดี ป่วยกะเพาะอาหาร ป่วยห้องน้ำ ท้องผูก ทabenam แห้ง วิงเวียนและป่วยคีริยะ ถ้าใช้ดือนพิษ ใช้คั้งท่อไปนี้

1. งูกัด ใช้ใบสด 1 กำมือ ตำคั้นน้ำกินເຫຼາກພອກ
2. ผึบวนอักเสบ ใช้ใบกำสมกับเหล้าພອກ
3. แมลงกัด ต่อย ใช้ใบสดตำພອກ
4. โรคหนองใน บໍสສາວະເບີນເລືອດ ใช้หັ້ງກັນສົກສັກ

30 กรัมก้มน้ำกิน

5. กาແກງນัว ມອງເຫັນພວ່ມນัว ใช้ເນັດຄະໜັງ 15 ດົງ 30 กรัม ພສມນ້າກາລກຽວຄ 30 กรัม ຊົງນ້າກິນ

6. ແກ້ໄຂນ້າເລເຮີຍ ໃຊ້ເນັດຄວ້ວໃຫ້ເກຣີຍນົກເບີນພົງກິນ
ກຽງຄະ 6 ດົງ 10 กรัม ວັນຄະຕອງກຽງ

7. ລົດຄວາມຄັນໂລທິກສູງ ໃຊ້ເນັດຄວ້ວໃຫ້ເກຣີຍນົກເບີນພົງກິນກຽງຄະ 3 ດົງ 4 กรัม ພສມກັນນ້າກາລກຽວຄຊັງນ້າກິນເບີນປະຈຳ

8. ແກ້ໄໂຮກະເພາະອາຫາຣແຕະລຳໄສ້ອັກເສັງເວຼົອຮັງ ທົ່ວງ

ผู้กabeenประจำ ระบบการย่อยอาหารไม่ถูก ใช้เม็ดคั่วให้จุน เหลือง 15 ถึง 30 กรัม บดให้เป็นผงรับประทานต่อวัน ประมาณ 10 วัน

3. บวบกลม บวบเหลี่ยม ทั้งสองชนิดใช้เป็นยา ได้ผลเช่นเดียวกัน ใช้ประโยชน์กังต่อไปนี้

1. ใบสักใช้ต่ำพอกแพล ไฟลวก เอาใบคั่วให้แห้ง เป็นถ่าน แล้วบดเป็นผง ผสมกับเหล้าขาว รับประทาน กรังละ 6 ถึง 15 กรัม ใช้รับประทานแก้สกรีทกเลือก

2. แพลงกอกกับในการนึ้งหรืออนอนนาน ๆ ใช้เปลือก ผลผิงไฟให้แห้งบดเป็นผงผสมเหล้าทา

3. ไอหอบ ใช้ตอกผสมน้ำผึ้งก็มีจินกิน

4. บิดถ่ายเป็นเลือด มีเลือกออกในลำไส้ ริดสีดวง ทวารมีเลือกออก ยกเดือด ใช้รังผึ้ง (ไข่ผึ้ง) เพาเป็นถ่านบด เป็นผงรับประทานกรังละ 2 ช้อนโต๊ะ

5. คางทูน ใช้ผึ้งเพาเป็นถ่านบดเป็นผงผสมน้ำทารว เวณที่ปวก .

6. แพลงมีหนองเรือรังใช้น้ำคั้นจากผลทับทิย ๆ ได้ยิ่งคี

7. สุกรีประจำเดือนมาผิดปกติ ใช้ผ้า 1 ผืน เพาเป็นถ่านผสมเหล้ากินหลังอาหาร

8. สตรีหลังคลอดแล้วน้ำนมมีน้อย ใช้ผ้าเพาเป็นถ่านบคเป็นผงกินกับเหล้าครั้งละ 3 ถึง 6 กรัม แล้วห่มผ้าให้เหงื่อออก

9. ปวกหลังปวกเอง ใช้รากผิงไฟให้เหลือง บคเป็นผงกินกับเหล้าครั้งละ 6 ถึง 7 กรัม

10. ปวกหัวข้างเดียว .ใช้รากสด 90 กรัม ไข่เบี้ก 2 พอง ต้มกิน

11. เจ็บคอ .ใช้รากแซ่น้ำในภาชนะกระเบื้องแล้วรินเอาน้ำกิน

12. ฝี แผล มีหนองเรือรัง ใช้รากเกี่ยวอาบน้ำชาระแหด

13. จมูกมีหนอง มีกลิ่นเหม็นอาจมีอาการปวกหัวร่วมกัน ใช้เตาบวิเวณไก่รากยาวย平均 8 ถึง 12 ซม. เพาเป็นถ่านบคเป็นผงผสมเหล้ากิน

4. หัวยักกอาท (หัวใช้เท้า) ใช้ประโยชน์ทางยาได้ดังท่อไปนี้

1. บิกตี้เป็นเลือก และปวคเจ็บลำไส้ ใช้รากสก 100 กรัม ตำให้ละเอียกใส่น้ำ 1 แก้ว น้ำผึ้ง 1 แก้ว ทิ้มกิน ก่อนอาหารเข้าและเที่ยง
2. ปวคหัวข้างเดียว ใช้รากสกคันเอาน้ำผึ้งพิมเสน เล็กน้อย และให้ผู้บ้วนนอน ถ้าปวคข้างซ้ายเอาน้ำยาหยอก ชมูกซ้ายถ้าปวคข้างขวา ก็ให้หยอกชมูกขวา ถ้าปวคสองข้างก็ หยอกทั้งสองข้าง
3. แพลงไฟลวก กล้ามเนื้ออักเสบ ใช้รากตำพอๆ กัน
4. ปากเป็นแพลงเปื่อย ใช้น้ำคันจากรากสกอมบ้าน ปากกลัวคอมบ่ออยๆ
5. โกรกหนองใน เวลาบ้วสภาวะเจ็บปวดมาก เป็นน้ำ มึนสภาวะไม่ออยก ใช้รากสกขนาดใหญ่ หั่นเป็นแผ่นหนาขนาด เด็กประมาณ 1 นิ้ว จำนวน 4 ถึง 5 แผ่น แช่น้ำผึ้งไว้แล้ว นำไปปั้นในภาชนะเหล็กด้วยไฟอ่อนๆ เกี่ยวให้แห้งใส่น้ำผึ้งอีก 30 ถึง 60 กรัม เกี่ยวให้สุกทั้งไว้ให้เย็นรับประทานร่วมกับ น้ำเกลือ
6. เท้าเป็นแพลงเจ็บ ใช้รากสกต้มเอาน้ำชาดัง และ ใช้รากแห้งบดเป็นผงทาอีกที

7. มีເສັ່ນທະໜີຢາ ອອນທຶກຫາຍໃຈດໍາບາກ ຫາຍໃຈຂັ້ກ
ໃຊ້ເມັກນິ້ງໃຫ້ສຸກນົກ ລະເອີ້ຄຜສນນ້າຢືນທຳເປັນຍາເມັກຂານາຄເມັກດ້ວ
ເຂົ້າວິກິນກຽງລະ 30 ເມັກວັນລະ 3 ເວລາ

8. ເຕັກນີ້ສ່າວະເປັນເລືອກ ໃຊ້ໃນສົດກັ້ນເອົານ້າກິນ

9. ທ່ອມນ້ຳນັ້ນມສກວີເປັນກັ້ນບວນເຈັບ ນ້ຳນັ້ນກັ້ນ ໃຊ້ໃນ
ສົດກຳກັ້ນເອົານ້າ 1 ແກ້ວກັ້ນໄຫວ້ອນ ຜສນແລ້ວຫວູ້ໂໃຊ້ກັ້ນກັບແລ້ວ
ຮັບປະກາດ

10. ຄອແໜ້ງກະຫຍາຍນ້າ ໃຊ້ວາກສົດ 100 ກັ້ນ ກຳກັ້ນ
ເອົານ້າກິນ

11. ວັນໂຮກ ໄອເປັນເລືອກ ໃຊ້ວາກສົດ 1 ກ.ກ. ໄສ້ນ້າ
300 ຊື້໌ ກັ້ນໄຫ້ແລ້ວນ້າ 100 ຊື້໌ ເອາກາກທັງຜສນສາຮັ້ນ 10
ກຽມ ນ້ຳຜັ້ງ 100 ກຣມ ແບ່ງກິນກຽງລະ 50 ຊື້໌ ວັນລະ 3 ເວລາ
ກ່ອນອາຫານ

12. ອາຫານໄມ້ຢ່ອຍ ທ້ອງອົດເພື່ອ ເຮືອເປົ້າຢາ ໃຊ້ວາກ
ຫວູ້ໂໃນສົດເຄີ່ງວິກິນເລືອກນ້ອຍ ສໍາຫວັບຮາກແລະໃນສຸກແໜ້ງຄອງເກລືອ
ກິນຈະໄຟໄກຜົດ

13. ຄລື່ນໄສ້ອ້າເຈິຍ ເຮືອເປົ້າຢາ ໃຊ້ວາກສົດກຳໄຫດະ-
ເອີ້ຄກັ້ນກັບນ້ຳຜັ້ງເຄີ່ງວັນປະກາດ

14. เสียงແບ່ນແທ້ ໃຊ້ຮາກສົກຄົນເອົານ້າຜສມນ້າຂຶ້ງກີນ
15. ເລືອດກຳເຕົາອອກໄມ່ຫຍຸດໃຊ້ຮາກສົກກຳກັນເອົານ້າຜສມ
ເຫຼັດເລັກນ້ອຍກີນ ແລະເອົານ້າຄັນສວນຈຸນຸກຂ້າງທີ່ເລືອດອອກ
16. ທັນຜູກເນື່ອງຈາກການບົນກວ່າຂອງລຳໄສພິກຸປົກໃຊ້ຮາກ
ສົກ 100 ກຣັມທີ່ເປັນແຜ່ນໄສ້ນ້ຳ 1 ລົກຮ ຕົ້ນໄທເຫຼືອນ້ຳ 100
ມສ. ກິນກຽງເຄີຍວຸນກວັນລະ 1 ຄຽງ

ຂ້ອກໜຳໃຫ້ ຜູກທີ່ເປັນໂຮມພັນອາຫາຣໄນ່ຢ່ອຍ ຫ້າມກິນຈາກ
ຜູກທີ່ມີຮ່າງກາຍອ່ອນແອງແລະຫອນທີ່ກ້າມກິນເມີລົກ
ຮ່າງກາຍອ່ອນແອງເລືອຖິນ້ອຍຫ້າມກິນເມີລົກແລະ ໃບຂອງ
ຜັກກາດຫວ້າ

5. ເຫັນຄອກ ຖັນກັນມີຮູ່ໆ ຂມ ອຸນ ຕຸນ ມີພິມເລີກ
ນ້ອຍ ໃຫ້ປະໂຍບນໍເບີນຍາໄກດັ່ງນີ້

1. ແກ້ວປົວຂ້ອງເກີດຈາກຄົມຂຶ້ນ ໃຊ້ໃນສົກ 30 ກຣັມ ຕົ້ນ
້າຜສມເຫຼັດເກີນ
2. ແກ້ຜິກ່າງ ຖ້າໃຊ້ກັນສົກກຳພອກ
3. ແກ້ແຜດ ນວນແຕງ ພົກໜ້າ ແຜດເນົ່າ ໃຊ້ທັງກັນ
ກຳພອກ

4. กระถุงหรือก้างปลาติกคอ ใช้เมล็ดหรือรากสก์คำให้ลักษณะคล้ายกลิ่นสูงไปช้าๆ และใช้น้ำอุ่นบ้วนปาก (ยานี้ลักษณะพื้นได้)

5. แก้น้ำน้ำ ใช้ราก 4 ถึง 5 ราก ทั้งกับเนื้อหมูกิน

6. ประจำเดือนไม่มา ใช้เมล็ดแห้ง 60 กรัม บดเป็นผงใช้น้ำผึ้งทำเป็นเม็ดกินวันละ 3 ครั้งๆ ละ 3 ถึง 4 กรัม

7. ซอกข้างเล็บอักเสบ บวม หรือเล็บถูก ใช้ยอดต้นนาตาลแดงตำพออกราก

8. แพลเรื้อรัง ใช้ใบแห้งบดเป็นผง ผสมพิมเสนไส้แพลง หยิ่งมีครรภ์ห้ามรับประทาน รากห้ามไม่ให้กินมาก

9. ใช้หง้ากันทำกันเอาน้ำ (หัวใช้เครื่องเหล็ก) ใช้หง้ากเคลือบหง้าไฟเกี่ยวให้เหนียว ใช้หัวผึ้งคำร้อยต่างๆ และผือกเสบบุชนิกก์ยังไม่แทรกให้ผลคีมาก

6. กระเมืองตัวเมีย (เข็กบักเช้าเจ็น) หง้ากันมีรสเปรี้ยวซุ่มเย็น ประโยชน์ใช้ในทางยา

1. แก้อาเจียนเป็นเลือด ใช้หง้าก 120 กรัม หั่นชงกัวยน้ำบํัตสาวยังเค็กอยู่ไม่เกิน 10 บีกิล

2. แก้อิ่มเป็นเลือด ใช้หง้าก 60 กรัม ตำกันยา

น้ำผึ้งน้ำอุ่นกิน

3. แก้เลือดกำเดาออก ใช้กันสก 1 กิโล ล้างให้สะอาดท่าคันเอาน้ำคุนให้ร้อนกินหลังอาหารวันละ 2 ครั้งเช้าเย็น
4. แก้หันของในบ๊สสาวะเป็นเลือด ใช้ใบสกรวมกับใบผักกาดนาน้ำยาสก ฯ อย่างละ 60 กรัม ทำคันเอานาน้ำกินวันละ 2 ครั้งเช้าเย็น
5. แก้เลือดในลำไส้และในปอด (เลือดอกใน) ใช้เมล็ดพิงไฟให้แห้งบดเป็นผงผึ้งผึ้งน้ำข้าวกินกรังละ 6 กรัม หรือใช้กันสก 10 กรัมผึ้งน้ำกาลกรวาก้มน้ำกิน
6. แก้นิบค่ายเป็นมูกเลือดใช้กันแห้ง 30 กรัมก้มน้ำกิน
7. แก้น้ำคัดแผลมีเลือดออก ใช้กันสกกำพอก
8. แก้ป่วยหัวข้างเดียว ใช้น้ำกันจากก้นสกหยอดกожมูกเวลาป่วย
9. แก้ท้อความาก ใช้กันแห้ง 30 กรัม ก้มกินกับเบีกหรือหมูได้
10. แก้ซ่องคลอคเป็นผื่นคัน ใช้กันสก 120 กรัม ก้ม เอาน้ำผึ้งกับสาลสัมชะลัง
11. แก้เก็งปากเปื้อย เนื้องจากเชื้อร้ายใช้น้ำกันจากใน 2 หยดผึ้งน้ำผึ้ง 8 หยด ทาแพตเจ็บนั้นบ่อยๆ

7. ข่าพริก (เล้งคุ้ย) มีรากน้ำ อามเปรี้ยว บางครั้งขม
หวาน รสเย็น ชาวดะวันอกบอกร่วมพิษเล็กน้อย แต่ชาวดะ-
วันอกบอกร่วมไม่มี

1. ใช้ร้อนใน ใช้ขาพริก 30 กรัม ท้มน้ำรับประทาน และยังแก้ความคันโลหิตสูงได้ดีอีกด้วย

2. ໄຟເພຣະປວກຮັນ ໄຊ້ຈ່າພວກ 30 ກວັນ ກົມກັນ
ເທົ່ານຸ້ຽນປະຖານ

3. เจ็บคอ ใช้เจ้าพริก 30 กรัม หอยนางรม 30 กรัม กัมมังสวิทต์ ใส่กับน้ำอ้อยรับประทาน

4. ໂຮກລັກນີ້ຄລັກເນື່ອເລືອດອອກການໄວພິ່ນ ໃຊ້ 30 ກວມ
ກົມກັນກັງສະກິນດີ

5. ใช้ทั้งทันท่วงทันน้ำอ้อยพอกผื่นแพลต

6. หนูกัดแล้วเป็นแพลงใช้ท้ากันน้ำอ้อยพอๆ บางคราว
ยังบอกว่าใช้รักษาภัยและมะเร็งได้อีกด้วย

7. ใช้ทึบกันก้มน้ำชาดลัง แก๊สกรีฟที่เป็นมะเร็ง ในช่อง

100

1. ໄສຕຶ່ງອັກເສນ ໃຫ້ຫຼູ້ລັ້ນໆເທົ່າ 120 ກຣັມ ຕໍາກັນ
ເອນ້າຜສນນ້າຜົງກິນ
2. ສໍາໄສຕຶ່ງເສນ ໃຫ້ຫຼູ້ລັ້ນໆເທົ່າ 70 ກຣັມ ຜສນກັນ
ຜັກເບີ້ຍໜຸ້ (ຜັກເບີ້ຍແກງ) 70 ກຣັມ ຕົ້ມກັນນ້າອ້ອຍຮັບປະການ
3. ອອນແດຈທົວຮັນ ໃຫ້ຫຼູ້ລັ້ນໆເທົ່າໃຫ້ກັນຫຼູ້ກະະ
ຊັກໂຮ້ອຫຼູ້ຜມຍຸ່ງ ອຍ່າງຕະ 30 ກຣັມ ຕົ້ມຜສນນ້າອ້ອຍຮັບປະການ
4. ໂອພຣະປອກຮັນ ເຈັບຄອ ໃຫ້ຫຼູ້ລັ້ນໆເທົ່າ 30
ກຣັມຕົ້ມກັນຕັ້ງກວຍແຈ່ຮັບປະການ
5. ປວກພື້ນ ໃຫ້ຫຼູ້ລັ້ນໆເທົ່າ 30 ກຣັມ ຂະເໜນ 5
ກຣັມ ຕົ້ມນ້າຮັບປະການ
6. ພົວහັນເບື່ອຜີ່ ແຜລອັກເສນ ແສນຮັນ ນວນ ກໍາ
ຜສນນ້າອ້ອຍກິນ
7. ເບື່ອໂຫດເກືອນທີ່ນົມມື່ອ ໃຫ້ຫຼູ້ລັ້ນໆເທົ່າກຳຜສນເຫຼັ້າ
ພອກໃຫ້ຜັກພື້ນ
8. ຖູກັກ ໃຫ້ຫຼູ້ລັ້ນໆເທົ່າ 250 ກຣັມ ກໍາຜສນເຫຼັ້າກິນ
ແລ້ວເອາກາກພອກທີ່ແຜດ
9. ເນື້ອງອກ ແຜລວ້າຍຫົວມະເງິນກາຍນອກ ໃຫ້ຫຼູ້ລັ້ນໆ
ເທົ່າກັນຫຼູ້ພະຈັນທົງກົງເຈົ້າກຳພອກ ດັ່ງໃຫ້ກາຍໃນໃຫ້ຫຼູ້ລັ້ນໆ
ເທົ່າກັນຫຼູ້ພະຈັນທົງກົງເຈົ້າກຳຕົ້ມຮັບປະການ

๐

615.89

:633.88

ส่วน

ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยฯ



BT5649

สมุนไพร : ฉบับแนะนำ